

能傳入人的胃腸否？豬糞尿未經腐熟醱酵，不合用於種菜，灌於菜之行間又應掘穴灌肥後覆蓋。但常見有人，將豬屎尿直接灌於葉菜類之菜葉者，甚為不合衛生，事實為如何？（虎尾鄭錦聲）

【答】：豬糞尿瀝於葉菜為追肥，是不衛生的，如葉菜不經煮熟供食用時，附著葉菜的豬糞尿仍可使入感染，寄生於人體。最好豬糞尿是供為製造堆肥材料，做成堆肥，經腐熟後，用為基肥，或挖溝施肥後蓋土較為適宜。（劉永和）

一年以上木瓜不能移植

氮化鈣鈣宜做堆肥施用

【問】：①木瓜與番石榴間作，樹間距離大小，是否會影響木瓜結實或收成量？會發生怎樣的情形？現已開花結實，是否可移植？要怎樣處理？②木瓜落葉每株要落多少較理想？與三葉菜併落有無影響？其效果如何？③氮化鈣對木瓜是否有很大效果？（屏東縣徐培壽）

【答】：一、木瓜栽培株行距最少要二公尺見方，間作番石榴應增加至三—四公尺，視番石榴樹大小決定，距離過小，木瓜莖部細弱勢高，經濟壽命短，產量因生育不良，不但不會增加，反而會減少，宜於將產量少的兩性株拔除，以便擴大距離，促進雌株結果。一年以上木瓜不能移植，移植後生育也不會好。

二、雞糞充分腐熟後施用，每株十公斤已够，如來源無問題，可不必再施化學肥。

三、氮化鈣鈣，除做堆肥併施用外，不宜直接施於木瓜，以免肥害發生。（戴邦本）

果園中可以種銀合歡

須種在果樹的樹蔭外

【問】：一、果園中可否種植銀合歡？是否妨害梅和荔枝的生長？二、據豐年刊載，銀合歡是有益灌木，但吸收肥份的力量比果樹強或弱？如何比例？三、銀合歡的根部根瘤菌對果樹是否有益？四、果樹與銀合歡的距離多少才適宜？（南投縣林乃群）

【答】：一、可以種銀合歡，以保持土壤

桃園龍潭可種番石榴

檸檬等宜在冬季定植

【問】：一、桃園龍潭可否種植番石榴？二、我希望種植龍潭形大四季可生產的那一種，請告種名及何處可購得大批種苗。三、檸檬及檸檬，龍潭可否種植？何處可購得大批可靠種苗？四、請詳示番石榴、檸檬、檸檬三種果樹栽培最適宜時間和方法。（桃園龍潭程維新）

【答】：一、可以種植番石榴。二、果形

水分，雖稍有妨礙梅和荔枝的生長，但影響輕微。二、銀合歡吸收肥料的力量不強，它有根瘤菌，能固定空氣中氮素，以供銀合歡的營養。但銀合歡從土中搶走一部分磷、鉀及其他肥料。三、銀合歡的根瘤對果樹有益。四、荔枝與銀合歡的距離須為二十至三十尺，梅樹與銀合歡的距離須為十二至十六尺，總而言之，銀合歡必須種在果樹長成後的樹蔭外，若在樹蔭下，這株銀合歡受不到陽光，是長不好的。（蔡致誠）


大，品質好，而產量高的四季番石榴品種有「石汾月拔」、「東山月拔」、「廣東月拔」等，種苗可向彰化縣永靖鄉新高種苗園洽購。

三、檸檬可以種植，檸檬則樹能發育，但結果不良。購苗處同上。四、三種果樹都在冬季定植，掘穴施入腐熟堆肥於穴底，并和土壤後定植果苗，苗根必須導使向四方及下方斜展，苗幹入土深度，必須與其在苗圃時一樣深淺。（蔡致誠）

林昭光、廖福有、鄒松梅、林斌能、徐茂桂、黃哲雄、翁盛文、賴俊逸、徐振明、王先化、姜獻庭、余光、吳瑞章、紀成業、陳存德、張明雄、朱春鑫、陳水泉、黃春盛、蔡萬見、賴登興、劉炎陽、楊金石、徐接興、陳金成。

以上各農友的信，正轉送各專家解答中，請靜候本社的回信。

## 稻熱病的特效藥



# 日農シムル錠

日農新米裕錠（散布用有機水銀劑）  
每包30片美麗塑膠盒

成分：有機水銀（PMA）（PMC）（PMF）三種水銀化合物

特徵：綜合三種水銀之特性各別發揮強力效果混合安特靈，把拉松同時防治螟蟲類

防治：水稻，小麥，果樹，蔬菜，瓜類等多種病害

同系統製品：シムメル乳劑

**泰洋股份有限公司 謹白**  
臺北市重慶北路二段108號 電話 44994號

## 獻貢大一

# 防頑

弱產・血育  
乳無・槽儉  
痢白・咳喘

每天二片

# 命靈安猪

減少母猪子猪疾病損失  
提高子猪品質防止乳猪喘咳、白痢

請速用

優待 試用

農事小組 研究  
班長，村  
里幹事，  
農場，種  
農場，酪  
農家！  
請速用

鴻春家畜藥廠  
北縣板橋鎮長安路一八一號  
台郵政劃撥儲蓄部