能傳入人的胃腸否？豬糞尿未經腐熟釀酵，不合用於種菜，灌於菜之行間又應掏穴灌肥後覆蓋。但常見有人，將豬屎尿直接灌於葉菜類之菜葉者，甚為不合衛生，事實為如何？（虎尾鄭錦墀）

【答】：豬糞尿灑於葉菜為追肥，是不衛生的，如葉菜不經煮熟供食用時，附着菜葉的豬蛔蟲卵仍可使人感染，寄生於人體。最好豬糞尿是供為製造堆肥材料，做成堆肥，經腐熟後，用為基肥，或挖溝施肥後蓋土較為適宜。（劉永和）

一年以上木瓜不能移植
氰氨化鈣宜做堆肥施用

【問】：①木瓜與番石榴間作，樹間距離大小，是否會影響木瓜結實或收成量？會發生怎樣的情形？現已開花結實，是否可移植？要怎樣處理？②木瓜落葉裹每株要落多少較理想？與三葉葉併落有無影響？其效果如何？③氰氨化鈣對木瓜是否有很大效果？（屏東縣陳增鑫）

【答】：一、木瓜栽培株行距最少要二公尺見方，間作番石榴應增加至三—四公尺，視番石榴樹大小決定，距離過小，木瓜莖部細樹變高，經濟壽命短，產量因生育不良，不但不會增加，反而會減少，宜於將產量少的兩性株拔除，以便擴大距離，促進雌株結果。一年以上木瓜不能移植，移植後生育也不會好。

二、鷄糞充分腐熟後施用，每株十公斤已夠，如來源無問題，可不必再施化學肥。

三、氰氨化鈣，除做堆肥合併施用外，不宜直接施於木瓜，以免肥害發生。（戴邦本）

果園中可以種銀合歡
須種在果樹的樹蔭外

【問】：一、果園中可否種植銀合歡？是否妨害梅和荔枝的生長？二、據農年刊載，銀合歡是有益灌木，但吸收肥份的力量比果樹強或弱？如何比例？三、銀合歡的根部根瘤菌對果樹是否有益？四、果樹與銀合歡的距離多少才適宜？（南投縣林乃群）

【答】：一、可以種銀合歡，以保持土壤水分，雖稍有妨礙梅和荔枝的生長，但影響輕微。二、銀合歡吸收肥料的力量不强，它有根瘤菌，能固定空氣中氮素，以供銀合歡的營養。但銀合歡從土中搶走一部分磷、鉀及其他肥分。三、銀合歡的根瘤對果樹有益。四、荔枝與銀合歡的距離須為二十至三十尺，梅樹與銀合歡的距離須為十二至十六尺，總而言之，銀合歡必須種在果樹長成後的樹蔭外，若在樹蔭下，這株銀合歡受不到陽光，是長不好的。（蔡致謀）

桃園龍潭可種番石榴
檸檬等宜在冬季定植

【問】：一、桃園龍潭可否種番石榴？二、我希望種植菓形大四季可生產的那一種，請告種名及何處可購得大批種苗。三、檸檬及檬果，龍潭可否種植？何處可購得大批可靠樹苗？四、請詳示番石榴、檸檬、檬果三種果樹栽培最適宜時間和方法。（桃園龍潭程維新）

【答】：一、可以種植番石榴。二、果形大，品質好，而產量高的四季番石榴品種有「石汾月拔」「東山月拔」「廣東月拔」等，種苗可向彰化縣永靖鄉新高種苗園洽購。三、檸檬可以種植，檬果則樹能發育，但結果不良。購苗處同上。四、三種果樹都在冬季定植，掘穴施入腐熟堆肥於穴底，拌和土壤後定植果苗，苗根必須舒使向四方及下方斜展，苗幹入土深度，必須與其在苗圃時一樣深淺。（蔡致謀）

* * *

林昭光、盧福有、鄒松梅、林斌能、徐茂柱、黃哲雄、翁盛文、賴俊逸、徐振明、王先化、姜獻庭、余光吳瑞章、紀成業、陳存德、張明雄、朱春鑫、陳水泉、黃春盛、蔡萬見、賴登興、劉炎陽、楊金石、徐接與、陳金成。

以上各農友的來信，正輯送各專家解答中，請靜候本社的回信。

稻熱病的特效藥
日本農藥
日農シンメル錠
日農新米裕錠（散布用有機水銀劑）
每包30片美麗塑膠盒
成分：有機水銀（PMA）（PMC）（PMF）三種水銀化合物
特徵：綜合三種水銀之特性各別發揮强力效果混合安特靈，把拉松同時防治螟蟲類
防治：水稻，小麥，果樹，蔬菜，瓜類等多種病害
同系統製品：シンメル乳劑
泰洋股份有限公司 謹白
臺北市重慶北路二段108號 電話 44994號

