



當心仔豬的呼吸器疾病

黃立羣

仔豬在出生後三—四日發生咳嗽，自鼻孔流出粘液，此時就應考慮下列的三種病症：

感冒 (鼻炎)

本病多發生在冬季，梅雨季節也容易發生，體質虛弱營養不正常的體重標準。主要症狀是咳嗽，並自鼻孔流出水樣粘性或化膿性的鼻液，仔豬胃口雖無任何變化，但精神不振，體溫升至四十度，耳端、腳尖及鼻端很冷，眼睛充血，眼內充滿不潔物。

本病如不及早處理，很易引起氣管炎或肺炎而死。要注意的是豬舍內保持清潔、乾燥，在寒冷時要多敷草類，特別是剛分娩的仔豬，要注意保溫。發病後用微溫食鹽水，一—二%重曹水，或〇·五—一%的明礬水，將鼻孔內排出液洗滌乾淨，或用上述藥液加溫發生蒸氣，設法通至仔豬的鼻端，讓仔豬吸入亦可。又可用5%的葡萄糖食鹽水十至十五立方公分(cc.)，注入腹腔內，病重的在十二小時內行三—四次反復注入則有效。

流行性感冒 (仔豬グ)

患本病後即無食慾，呼吸困苦，咳嗽，眼鼻都有粘性液體流出，往往因衰弱而死，或萎縮不發育。

預防本病，須在平時注意豬舍的清潔、乾燥、溫暖(在夏季要注意通風涼快)，及合理的飼養管理。發病後沒有什麼特效藥可供治療，只能用5%的葡萄糖食鹽水五至十立方公分注入腹腔內，或以盤尼西林與磺胺類藥物併用，以防併發症發生。如有呼吸病狀時，可試用樟腦一份，炭酸鈣一份，氯化鈣(融砂)二份，混合後每次用一—二公分，每日二次，連給數日。

豬肺炎 (肺炎)


體質虛弱的仔豬，容易染患本病，急性的數日內即死，慢性的可經數星期以上。急性型的體溫高，約在四十一度，發出短的可經

性咳嗽，呼吸速迫，喘鳴。鼻孔內流出粘性液，呼吸十分困難，無食慾。慢性的常咳嗽，呼吸困難，食慾不振，便秘或下痢，關節腫脹，漸漸的衰弱而死。

農小業識

△去年起，農林廳與農復會合作，在新竹、臺中、臺南三地區，舉行在來稻品種地方試作試驗。
△「臺中在來一號」豐產耐肥，在試作區的產量超過一般在來品種，極受農民歡迎，但目前還沒達到推廣的階段。
△磷肥對綠肥作物的增產有顯著的效果，栽培綠肥作物，每公頃可施磷肥二百公斤。
△分配於水稻的磷肥，可在前作的綠肥作物，或用於製造堆肥，提高磷肥的肥效，比直接施用於水稻田更為有利。

無特效藥可治，初期可注射免疫血清，或用抗生素藥品，以防其他併發症發生。慢性的可用肺疫疫苗，加倍量注射。在平時應注意豬舍清潔、乾燥、溫暖，以防本病的發生。



，友朋的送出物奉
，知剪受備防人人
。(法手竊偷)手高領鈕剪(怕不)驚嚇



，細注着外器金注錢有
，多帶(要不)而量盡(錦金)下意
。(你偷)捉你加法無鈕剪



，誠不良甚偷場市站車
，財錢入內車汽場是部
。(所場)在所的動活是部