

我怎樣飼養肉用羊？

我認為，肉用羊飼養是最安全可靠，而獲利又大的一種畜牧事業。下面將我的經驗，發表給各位參考：

種羊選擇法



羊毛應有光澤 不論顏色如何，羊毛應有光澤，反之則為體弱多病，或患有內寄生蟲等症，不宜購買。

體型應為長方型 體型長方型者為上等種羊；尖屁股、頸子長者，均不宜作種羊之用。

腿腳要粗大 腿腳愈粗大愈好。

年齡不可太老 以一歲半至四歲為理想，可由羊角與鬍鬚鑑定。嫩黑色角表示年輕，黃或灰白者表示年老。一歲半的種羊（公羊例外）通常沒有鬍鬚，鬍鬚愈濃密者年齡愈大（公羊亦同）。

奶水多 奶房大還要有彈性，鬆弛者即使再大仍是無用。

農業小知識

△初孵出的小火雞的飼料，需要蛋白質飼料較多，這是因為火雞發育比普通雞隻快，而且體格較大的緣故。

△小火雞開始不大會吃飼料，應小心教飼，亦可將切細幼菜葉（綠色）撒於飼料上，以引誘其啄食。

△陸地鴨每年產卵好的均在二百五十枚以上。沒有水的地方可以飼養，但是有水供鴨隻游泳產卵成績要好些。

△陸地鴨，可與番鴨雜交，雜交一代可供肉用（是不會產卵的）。

△鴨隻有互相堆疊的習慣，管理者在晚間要施行數次的巡視，把堆擠者移開。

羊欄的建修

羊欄須空氣流通，光線充足。地面應略成傾斜。

羊床離地約四十公分，不可過低或過高，且不宜過大；以一公尺寬的長條形為恰當（長度視羊棚情況決定）。

飼料與管理

食鹽不可過量 給與過多食鹽，會使山羊中毒而死。最好用竹筒（筒底打小孔若干），懸吊於羊棚內，令其舐食。

毒蛇蜈蚣有害無益 農友們常用毒蛇蜈蚣浸於鹽筒，以其腐爛汁供羊舐食，相傳以毒攻毒可以治病，但經筆者試用，食用者均告死亡。

徹底驅殺寄生蟲 外寄生蟲應用DDT噴射全身（但眼耳口鼻不可噴射），之後立刻施以水浴，再以乾布擦乾即可。羊欄也需在打掃後用DDT或BHC消毒，以殺死餘蟲。內寄生蟲可用市售之畜蟲散驅除。

小羊不宜洗澡 小羊千萬不要洗澡，否則母羊必因嗅不出小羊特具之氣味而拒絕餵奶。

閹羊不可太早太晚 通常在二十天左右閹割較為恰當。過早會影響生育。

彰化市 彭應潭
龍涎路

優厚的利益

肉用羊飼養，是最有利的。一種畜牧事業，如有適當草地放牧，則可不需另外花錢購買飼料，且母羊平均每年生產二胎，每胎少者一隻，多則四或五隻（平均每胎二隻）；所生產的小羊，快者七個月，慢則一年（平均九個月），又能再生小羊，羊肉的售價，又比豬肉好。

，過晚易因流血過多死亡。
不要淋雨 羊最怕淋雨，淋雨後百病叢生，不可不注意。
保持羊舍清潔 山羊喜受清潔，羊欄最好每日打掃，糞便可做肥料使用。



羣羊的友農潭應彭

SEVIN

文 (七 ビン)

50%可濕粉劑

茶 (避債蛾, 捲葉蟲, 小白紋毒蛾)
菸草 (螟蛉蟲, 青蟲, 綠椿象, 夜盜蟲)
蔬菜 (夜盜蟲, 猿葉蟲, 菜心蟲)
香蕉 (粉介殼蟲)

鳳梨 (粉介殼蟲)

農友們！
你們現在
還不瞭解
SEVIN
的利害嗎？

對於人畜最安全，而最強力殺蟲劑

臺灣代理：子美行

總經銷：華南貿易行 台北市天水路11號 Tel 47588