

雪裡紅芥菜只有一個品種
耐寒力強高溫期生長不良

【問】：一、「雪裡紅」有多少品種？二、農曆二月初適合種那一種？何處可購到好種子？三、「雪裡紅」移植期間最早何時？最晚何時？（臺南謝勳）

【答】：一、「雪裡紅」芥菜只有一個品種，近似品種有金絲芥菜、水芥菜等品種。因為此種芥菜耐寒力強，能在嚴寒發生長，所以稱為雪裡紅。

二、種子請向臺北農產企業公司或興盛種子行函購。

三、本省之播種期為八月至二月，高溫期生長不佳，栽培成績不好，育前期間二十天左右，此種芥菜耐寒力強，栽培時應注意防治。（陳文郁）

稻穀陳年種子保存得好
發芽率不會有重大影響

【問】：一、我培植第二期水稻是嘉南二

號，栽培多年，品種變劣，想選優良的嘉南二號品種，何處有這品種？二、當地農友播陳年種子，發芽率約七分（七〇%）。但是我近二年來都是用第一期所收的種子播種，那一種方法較佳？（桃園縣劉榮興）

【答】：一、「嘉南二號」換種，可函洽嘉義市農區農業改良場嘉義工作站辦理。

二、稻穀留種如第二期作種子，明年第一期作應用可無問題。如第一期作種子連接當年第二期作應用，有時來不及，故可以應用隔年第二期作種子。種子保存得好，保存一年不致影響發芽率太大。種子要保存得好應注意下列要點：①收穫後充分乾燥（快晴日曬三天左右），少量種子放入瓦罎中封口，大量者貯入麻袋中。②放置高燥地方（麻袋下墊圓木（九寸或木板））。③放置冷凍通風場所。④儲藏期間，天晴時舉行中途乾燥一次。普通一期作種子常較第二期作飽滿，做種用甚佳。

啟行特選優良春季種子供應栽培

早熟的菜心白菜子
長筒菜心白甘藍子
二尺半長紅仁白甘藍菜子
幼細紅仁白甘藍菜子
黑仁青島菜子（紅帶尾）
黑仁青島菜子（黑帶尾）
正金年開花菜子
晚熟大號韭菜子
青皮目瓜子（甜瓜）
黑仁酸豆子
白仁酸豆子
青江白菜子
其他各色種子

清河種子行

金蓮種子行

中郵經銷處員林鎮新葉菜批發市場口
金蓮種子行劃撥儲金中宇第二〇八四號

嘉義市中正路四八二號
電話：三五八四號
劃撥儲金嘉字第八〇〇三七號

八十天油甘菜子

白杏菜子（虎耳菜）

正晚生白葉白骨片菜子

九子高脚晚生波發菜子

密斯打蘭波發菜子

正馬蘭種大葉應菜子

小葉應菜子

正青皮竹竿黃麻種子

日本黑葉美濃大根子

美國新型大五寸人參種子

美國加州大粒甜椒子

ロビヤング大粒甜椒子

ピーマ大粒甜椒子

丸葉山東白菜子（一條根）

海黑仔紅肉西瓜子

梨仔瓜子（黃香瓜）

扁甲芥菜子

大葉虎耳荷荷菜子

長圖交配大福壽壽トマト

正粗腰白菜子

青粉菜30天包心白菜子

農曆二月上旬就可開始下種

栽培西瓜如在砂質土地
最好充分施用腐熟堆肥

【問】：播種西瓜施用人糞尿做基肥（即大肥），是否影響根部的生長，對於發育情形如何？（花蓮縣徐坤成）

【答】：用腐熟人糞尿作為西瓜的基肥是可以的，但是栽培地如果是砂質土，還是充分施用腐熟堆肥，才能使西瓜根群發達，增強抗病力，植株發育良好，增加產量和品質。又多施優良堆肥亦可減少肥假較高的化學肥料之施用而節省栽培成本。（陳文郁）

梨樹要嫁接良種「中生橫生梨」
砂地地可種蘋果和人心果等

【問】：①梨樹發育良好，約五公尺高而不開花結果，是否品種不佳，可以接枝嗎？請將詳細辦法賜告，不勝感謝。②嘉義縣竹崎鄉砂地，種植何種梨樹較適宜？（左營林宜成）

【答】：①梨樹長五公尺高，應該要結果

了。梨樹的實生株達結果年齡遲，而且，所結果實品質不良。所以一定要嫁接，接以優良品種如「中生橫生梨」的接穗。

嫁接採取切接法，時期自十二月底到次年二月初，以冬至前後為最適時期。接後接穗外用看葉葉包紮保護，以減少接穗的蒸發水份，促進成活。

※ ※ ※

林先立 黃坤潭 黃子川 瞿連君
彭應選 林進時 黃丁福 莫尚仁
黃錦興 黃德厚 王耀堂 黃東山
傅朝宗 孫義喜 陳連盛 黃坤
黃芳津 八德鄉農會
以上各農友來信，已轉請專家答覆中，請靜待本社回音。

地下殺蟲劑



美國威力克化學公司出品
臺灣獨家加工廠 中華山木農藥有限公司
臺灣總代理商 太安行股份有限公司

函索飛佈施粉劑使用說明書附郵票四角即寄