

蟲生二種內寄的雞

鷄蛔蟲與盲腸蟲

趙法清

病。盲腸蟲寄生於鷄或火雞的盲腸，除使鷄的營養發生障礙外，並與黑頭病發生有關。本省雖無正式的數字統計，但受害情形頗為普遍。

鷄蛔蟲

傳染 鷄蛔蟲雄蟲長約

三十八公分，雌蟲約六十一
二公分，多寄生於小腸，亦

有寄生於盲腸、腺胃者。蟲
卵極小，用肉眼無法看見。

蛔蟲寄生於小腸之後，
不斷地生產蟲卵。蟲卵隨鷄

糞排出，在適當的環境下經
二週左右，即成熟而具有傳
染力。家禽在吃飼料或飲水
時吃下成熟蟲卵，即被感染。

爲害 小鷄被寄生後，
發育受阻，甚致死亡。成鷄

寄生多時精神萎靡，羽毛紊
亂，鷄冠與肉垂蒼白，食慾
也受影響。如爲產卵鷄，則產卵率減低。此外也常
併發其他疾病。

鷄盲腸蟲

傳染

鷄盲腸蟲很小，雄蟲體長約七一一三公
厘，雌蟲一〇一一五公厘，多寄生於鷄或火雞的盲
腸。蟲卵更小，與鷄蛔蟲蟲卵相似。

爲害 盲腸蟲進入鷄體後，侵害盲腸壁。盲腸
壁肥厚則發生慢性加害兒。少數寄生時害狀不顯著
，多數寄生則發生營養障礙，同時常與黑頭病病原
體混合傳染。

預防

預防鷄蛔蟲及盲腸蟲的傳染，最重要的

預防及治療

到蟲卵的機會。無論飼料飲水，都應力求潔淨。幼
鷄與成鷄隔離飼養，更可保全鷄群的健康。

治療 對這兩種寄生蟲有效的藥劑有：①飛納
賽淨（フエノサイアジン），②比配拉淨（ビペラ
ジン），及③氟化鈉三種。

農業小知識

是注意環境衛生。環境衛生良好，則可減少鷄隻吃
到蟲卵的機會。無論飼料飲水，都應力求潔淨。幼
鷄與成鷄隔離飼養，更可保全鷄群的健康。

△所謂「瑞士」一種乳羊，就是「撒能」一種乳羊

△乳羊飼料，對乳質影響很大。飼料新鮮，蛋

白質含量較高，則可提高乳質。（陳）

△乳羊的價格，通常由體型、血統、產乳能力
、營養狀態等決定。目前一般市價約如下：一升乳
級一、五〇〇元左右，一升半乳級二、五〇〇左右
，二升乳級三、〇〇〇元以上，公羊生後二十三個

月約六〇〇元，一年一、二〇〇元，母羊一年生（
未經配種）一、五〇〇元左右。（陳）

△私人向國外購買種豬，須向農林廳及外貿會

申請外匯後才能進口。進口時，目前尚須付進口稅
，並在進口港口作三週繫留檢疫。（周）

△注射針頭斷留在豬皮內，因針頭曾經過消毒
，對發育是沒有什麼影響的。但是如果在針頭傷口
發現化膿現象，則應開刀取出並消毒傷口。（李）

△猪打噴嚏而流鼻血，如能在管理上保持豬舍
乾燥，多鋪墊草，打噴嚏現象即可漸行停止，流鼻
血情形也可消除。（李）

△「益生素」對小山羊促進生長有效果，但對
中、大山羊則不甚顯著。給與量每日爲四公分，混
入精料中每日餵兩次。不宜溶於水中給與。（李）

汰。產卵遲的鷄，產卵數目一定少，應予淘汰。
得病而致死的，像這樣的鷄，也應予淘汰。（李）

一本多利的飼料酵母

提高飼料營養·降低養畜成本

養殖·禽畜·牛·羊之妙品

50台斤飼料僅用1g

小袋10g23元

大袋40g80元

ハム菌 父母菌

台灣總代理：德生貿易有限公司

台南市民权路133 TEL 2964

說明書附郵四角備索

函購：劃撥30014号

各地農舍·藥房均售
(求經銷商)

製造元：日本營農協會株式會社
大阪市浪速區西浜北通