

蟲生寄內種二的雞

雞蛔蟲與盲腸蟲

趙法清

雞蛔蟲

雞蛔蟲寄生於雞腸，奪取雞的營養分，同時刺激腸部，併發其他疾病。盲腸蟲寄生於雞或火雞的盲腸，除使雞的營養發生障礙外，並與黑頭病發生有關。本省雖無正式的數字統計，但受害情形頗為普遍。

傳染 雞蛔蟲雌蟲長約三—八公分，雌蟲約六—一二公分，多寄生於小腸，亦有寄生於盲腸、腺胃者。蟲卵極小，用肉眼無法看見。蛔蟲寄生於小腸之後，不斷地生產蟲卵。蟲卵隨糞排出，在適當的環境下經二週左右，即成熟而具有傳染力。家禽在吃飼料或飲水時吃下成熟蟲卵，即被感染。

為害 小雞被寄生後，發育受阻，甚致死亡。成雞寄生多時精神萎靡，羽毛紊亂，雞冠與肉垂蒼白，食慾也受影響。如為產卵雞，則產卵率減低。此外也常併發其他疾病。

雞盲腸蟲

傳染 雞盲腸蟲很小，雌蟲體長約七—一三公分，雌蟲一〇—一五公分，多寄生於雞或火雞的盲腸。蟲卵更小，與雞蛔蟲蟲卵相似。盲腸蟲蟲卵排出後，在適當土壤約經七至二十日，即成熟而具有感染力。

為害 盲腸蟲進入雞體後，侵害盲腸壁。盲腸壁肥厚則發生慢性加答兒。少數寄生時害狀不顯著，多數寄生則發生營養障礙，同時常與黑頭病病原體混合傳染。

預防及治療

預防 預防雞蛔蟲及盲腸蟲的傳染，最重要的

是注意環境衛生。環境衛生良好，則可減少雞隻吃到蟲卵的機會。無論飼料飲水，都應力求清潔。幼雞與成雞隔離飼養，更可保全雞群的健康。
治療 對這兩種寄生蟲有效的藥劑有：①飛納賽淨(フエノサイアジン)，②比配拉淨(ビペラジン)，及③氟化鈉三種。

農業小知識

△所謂「瑞士」種乳羊，就是「撒能」種乳羊，在本省飼養乳羊，以「撒能」種最為適宜。(陳)
△乳羊飼料，對乳質影響很大。飼料新鮮，蛋白質含量較高，則可提高乳質。(陳)

△乳羊的價格，通常由體型、血統、產乳能力、營養狀態等決定。目前一般市價約如下：一升乳級一、五〇〇元左右，一升半乳級二、五〇〇元左右，二升乳級三、〇〇〇元以上，公羊生後二—三個月約六〇〇元，一年一、二〇〇元，母羊一年生(未經配種)一、五〇〇元左右。(陳)
△私人向國外購買種豬，須向農林廳及外貿會申請外匯後才能進口。進口時，目前尚須付進口稅，並在進口港口作三週留檢檢疫。(周)

△注射針頭斷留在豬皮內，因針頭曾經過消毒，對發育是沒有什麼影響的。但是如果針頭傷口發現化膿現象，則應開刀取出並消毒傷口。(李)
△豬打噴嚏而流血，如能在管理上保持豬舍乾燥，多鋪墊草，打噴嚏現象即可漸行停止，流血情形也可消除。(李)

△「益生素」對小山羊促進生長有效果，但對中、大山羊則不甚顯著。給與量每日為四公分，混入精料中每日餵兩次。不宜溶於水中給與。(李)
△開始產卵遲的雞，產卵數目一定少，應予淘汰。產卵遲是產卵少的遺傳特徵，但也有因小雞時得病而致使的，像這樣的雞，也應予淘汰。(李)

多利本省的飼料醱菌 提高飼料營養·降低養畜成本

養者飼雞牛羊之妙品

50台斤飼料僅用1g

巴公菌

小袋10g23元

大袋40g80元

提高消化
促進發育
改良肉質
增加產卵

各地農舍·藥房均售
(求經銷商)

製造元：日本畜農協會株式會社
大阪市浪速區西浜北通

台灣總代理：德生貿易有限公司
台南市民權路133 TEL 2964

說明書附郵四角備索
函購：劃撥30014号