

# 養兔技術經驗談

臺北市 許亮

養兔是農家好副業之一。有些農友因為沒有養兔的經驗，所以不敢輕易嘗試。本文作者根據他的經驗，寫成這一篇專稿，從這些技術要點看來，養兔也並不比養雞困難，有興趣的農友們，可以先從小規模開始試養。

## 兔舍設計

**圍飼** 飼養兔子，可以籠飼，亦可在地面圍飼。在地面圍飼，必須位置高凸，不受潮濕，用磚石砌圍牆，高於地面二台尺半，深入地下三台尺（防止兔子掘洞外逃）。每一平方格內飼養一隻母兔，十二至十五平方格備一隻公兔。

**籠飼** 如用竹籠或木籠，以三尺立方較宜，放置離地面二、三尺，籠底下層用竹條或木條製開格五分空隙，使糞尿下漏，以保持清潔。籠內裝置一小木盒，木盒高八寸，寬一尺，長一尺半，較長一邊的一端開一小洞，恰使一母兔出入，以備生產。

## 生產

**銜草築巢** 母兔將及生產時期，如飼養於地面者，則牠必須先自掘隧洞，並且銜草築巢。到了生產前一、二日，又將乳部旁及二大腿的毛取下，放置巢內草上，再過一、二日即生產小兔無疑。


**飼養籠內者**，母兔將近生產時，先進入木盒內爪搔木盒底板，後即銜草進入木盒內鋪置。到了生產前一、二日，也將乳部旁與二大腿的毛取下，放置木盒內草上。

**生產** 母兔首胎生產，多為一至四隻，次胎後有三、五至十二隻之多，但母兔的乳頭只有八個，如遇有九隻以上的小兔，便發生乳頭不敷，致使弱小者遭餓死亡。所以母兔生產超出六隻時，應將弱小者淘汰。

母兔每月生產一次，所以又有「月兔」之稱。通常在產後三十小時即可再交配（體弱者需二日）。

## 小兔發情

小母兔出生後五個月左右，便開始發情。初次發情很難察覺，當母兔行動不安時



。進外洞掘于免防以，下地入深應牆圍

— 一致養雞 · 豬 · 鴨的各家的好消息 —

# 防治貴家禽畜疾病、把牠們 餒肥養大、增產優良的蛋 · 肉

## 這就是增加貴家收入唯一的近路！

費用極小，用法簡便——ロメジンソーダ與ベキシン只要溶於禽畜的飲料水或混入飼料中就可達成目的。請立刻試用。

最新高畜驅蟲藥

預防/治療，雞病的特效藥

動物用

動物用




禽畜也和人一般，體內若有蛔蟲寄生，決不能肥大。請把ベキシン每月一次定期的給貴家禽畜吃而看牠們一天比一天的肥大。

【包裝】 30公分，100公分，500公分。


對家雞應染的一切疾病有顯著優秀的功效。雞在雛時尤易染病，這時期給與ロメジンソーダ，預防的效果更大

【包裝】 50公分，100公分，100片包



圓通製藥

### 全島有名藥店發售



法手準標的子先拿捉

交配後十八日內，無法察知有否受孕。十八日後將母兔後二腿向後拉直，前腳踏地，使其肚腹下墜，再用手緊貼下腹，如可摸到腹內的小丸塊，即表示已受孕。二十五日後即以眼睛察看亦可辨別。

### 日常管理

捉拿兔子，應以右手捉背肩上的鬚皮，再以左手托股髻為宜。只捉肩背皮而不托股髻，則易使母兔流產。脚或其他部位也不宜隨意捉拿。

兔子食量較大，但是黏有糞便的飼料即拒食，所以給飼時，需先將廢餘的飼料清除，再供給新飼料；每日早晚二次，份量要恰當。除供給飼料外，尚需投與食鹽，使兔子自行覓食。

### 疾病預防

兔子如有不思進食，打噴嚏，精神不佳，不想行動等情狀，即是受涼所致。如發現此病時，應即用炒過的米糠，加薑汁少許，用水調合，製成直徑五分較硬小丸，再用內心五分，長約三、四寸，一端削尖的竹管，將小丸裝進竹管孔心，再將削尖的一端插入兔嘴內，用一根恰合竹管孔心的圓木棍插入竹管，將小丸頂進兔子喉內，使其吞咽。在早晚未供飼料前餵食，每次約三、五粒，依病輕重酌量增減，二日內可愈。

夏天氣候炎熱，需注意中暑。中暑初期，有眼糞，口乾燥，思飲水，性情兇猛，氣喘，待至絕食後極難醫治。初發現此病時，即將兔子放置清涼地面上，再用涼水一碗加食鹽半匙調合，使自動飲食，欲完重備，經過一星期後漸愈。水份過多的飼料亦不宜供給，以免引發痢疾。痢疾輕者可自愈，重者能致死。患有痢疾時，亦可用炒過的米糠加薑汁製成小丸與喂。

，即察看陰部，如發現腫漲並有少許粉紅色黏液排出，即已屆發情期，應即交配。發情經二、三小時後停止，但過數小時後又再發情。交配時管理人帶在旁，看清楚有無正確受精。公兔騎在兔背上交配時，如正確受精後，公兔不能一躍而下，應左右翻倒至三秒鐘才爬起；母兔則待公兔活動後才開始行動。如受精不確，則母兔先行離開。



廉好 價格子用 牌信 用

機械乾燥鷄糞 常有萬斤歡迎惠購

首創臺灣養鷄法

電話臺北 31444

大地養雞場

電掛 FLYWHEEL

士林鎮福林路三六八號

信箱臺北1604號

郵儲劃撥2766號

來克亨	AA級	35'00	美日直接進口第一代附血統書
鹿花	A級	16'00	美日直接進口無附血統書
	B級	9'00	大地第一代鑑別母鷄的
緬漢西	B級	6'00	同上各種純種無鑑別
	30天中鷄	24'00	初心者請嘗不要育雛辛苦鷄痘
名古屋	60天肉鷄	40'00	新城預防完畢
三河	肉鷄	另議	拔雄各種第一三元交配等

可肉秀純種公母1對 150'00肉用專用美國新種  
本場試驗結果可用額公×緬漢西=F.I 60天到二整斤  
郵資三元或訂購者奉上育雛要領一份



經濟實惠的肥料醱母菌

肥料用 一頓之肥料僅用10g

父母菌 小公菌

大袋40g 80元 小袋10g 23元

用以農耕 果樹 花卉 魚塢上之肥料

父母菌之效果

- 1 堆肥之醱酵增加肥質。
- 2 改良土質，使土質軟化。
- 3 提高有機質肥料之效果。
- 4 使化學肥料之肥分持續。
- 5 增加水肥之肥分，消滅臭味。
- 6 製造粒肥，減少農作物病害。

各地農會、藥房、農藥行均售 說明書郵資四角備索

台灣總代理：德生貿易有限公司  
台南市民權路133號 TEL 2964  
總批發：元山製菓廠  
台南市復興路10巷42號 TEL 5775  
製造元：日本當農協會株式會社

用以稻魚蔬菜花菜甘藷西瓜菇