

養兔技術經驗談

臺北市 許亮

養兔是農家好副業之一。有些農友因為沒有養兔的經驗，所以不敢輕易嘗試。本文作者根據他的經驗，寫成這一篇專稿，從這些技術要點看來，養兔也並不比養雞困難，有興趣的農友們，可以先從小規模開始試養。

兔舍設計

圍飼 飼養兔子，可以籠飼，亦可在地面圍飼。在地面圍飼，必須位置高凸，不受潮濕，用磚石砌圍牆，高於地面二台尺半，深入地下三台尺（防止兔子掘洞外逃）。每一平方格內飼養一隻母兔，十二至十五平方格備一隻公兔。

籠飼 如用竹籠或木籠，以三尺立方較宜，放置離地面二、三尺，籠底下層用竹條或木條製開格五分空隙，使糞尿下漏，以保持清潔。籠內裝置一小木盒，木盒高八寸，寬一尺，長一尺半，較長一邊的一端開一小洞，恰使一母兔出入，以備生產。

生產

銜草築巢 母兔將及生產時期，如飼養於地面者，則牠必須先自掘隆洞，並且銜草築巢。到了生產前一、二日，又將乳部旁及二大腿的毛取下，放置巢內草上，再過一、二日即生產小兔無疑。


飼養籠內者，母兔將近生產時，先進入木盒內爪搔木盒底板，後即銜草進入木盒內鋪置。到了生產前一、二日，也將乳部旁與二大腿的毛取下，放置木盒內草上。

生產 母兔首胎生產，多為一至四隻，次胎後有三、五至十二隻之多，但母兔的乳頭只有八個，如遇有九隻以上的小兔，便發生乳頭不敷，致使弱小者遭餓死亡。所以母兔生產超出六隻時，應將弱小者淘汰。

母兔每月生產一次，所以又有「月兔」之稱。通常在產後三十小時即可再交配（體弱者需二日）。

小兔發情

小母兔出生後五個月左右，便開始發情。初次發情很難察覺，當母兔行動不安時



。進外洞掘于免防以，下地入深應牆圍

— 一致養雞 · 豬 · 鴨的各農家的好消息 —

防治貴家禽畜疾病、把牠們 餒肥養大、增產優良的蛋·肉

這就是增加貴家收入唯一的近路！

費用極小，用法簡便——ロメジンソーダ與ベキシン只要溶於禽畜的飲料水或混入飼料中就可達成目的。請立刻試用。

最新高畜驅蟲藥

預防/治療，雞病的特效藥

動物用

動物用




禽畜也和人一般，體內若有蛔蟲寄生，決不能肥大。請把ベキシン每月一次定期的給貴家禽畜吃而看牠們一天比一天的肥大。

【包裝】 30公分，100公分，500公分。

對家雞應染的一切疾病有顯著優秀的功效。雞在產時尤易染病，這時期給與ロメジンソーダ，預防的效果更大。

【包裝】 50公分，100公分，100片裝



大日本製藥

全島有名藥店發售