



法手準標的子先拿捉

交配後十八日內，無法察知有否受孕。十八日後將母兔後二腿向後拉直，前腳踏地，使其肚腹下墜，再用手緊貼下腹，如可摸到腹內的小丸塊，即表示已受孕。二十五日後即以眼睛察看亦可辨別。

日常管理

捉拿兔子，應以右手捉背肩上的鬆皮，再以左手托股髻為宜。只捉肩背皮而不托股髻，則易使母兔流產。脚或其他部位也不宜隨意捉拿。

兔子食量較大，但是黏有糞便的飼料即拒食，所以給飼時，需先將廢餘的飼料清除，再供給新飼料；每日早晚二次，份量要恰當。除供給飼料外，尚需投與食鹽，使兔子自行覓食。

疾病預防

兔子如有不思進食，打噴嚏，精神不佳，不想行動等情狀，即是受涼所致。如發現此病時，應即用炒過的米糠，加薑汁少許，用水調合，製成直徑五分較硬小丸，再用內心五分，長約三、四寸，一端削尖的竹管，將小丸裝進竹管孔心，再將削尖的一端插入兔嘴內，用一根恰合竹管孔心的圓木棍插入竹管，將小丸頂進兔子喉內，使其吞咽。在早晚未供飼料前餵食，每次約三、五粒，依病輕重酌量增減，二日內可愈。

夏天氣候炎熱，需注意中暑。中暑初期，有眼糞，口乾燥，思飲水，性情兇猛，氣喘，待至絕食後極難醫治。初發現此病時，即將兔子放置清涼地面上，再用涼水一碗加食鹽半匙調合，使自動飲食，欲完重備，經過一星期後漸愈。水份過多的飼料亦不宜供給，以免引發痢疾。痢疾輕者可自愈，重者能致死。患有痢疾時，亦可用炒過的米糠加薑汁製成小丸與喂。

，即察看陰部，如發現腫漲並有少許粉紅色黏液排出，即已屆發情期，應即交配。發情經二、三小時後停止，但過數小時後又再發情。交配時管理人帶在旁，看清楚有無正確受精。公兔騎在兔背上交配時，如正確受精後，公兔不能一躍而下，應左右翻倒至三秒鐘才爬起；母兔則待公兔活動後才開始行動。如受精不確，則母兔先行離開。



廉好 價格子用 牌信 用

機械乾燥鷄糞 常有萬斤歡迎惠購

首創臺灣養鷄法

電話臺北 31444

大地養雞場

電掛 FLYWHEEL

士林鎮福林路三六八號

信箱臺北1604號

郵儲劃撥2766號

來克亨	AA級	35'00	美日直接進口第一代附血統書
鹿花	A級	16'00	美日直接進口無附血統書
	B級	9'00	大地第一代鑑別母鷄的
緬漢西	B級	6'00	同上各種純種無鑑別
	30天中鷄	24'00	初心者請嘗不要育雛辛苦鷄痘
名古屋	60天肉鷄	40'00	新城預防完畢
三河	肉鷄	另議	拔雄各種第1代三元交配等

可肉秀純種公母1對 150'00肉用專用美國新種
本場試驗結果可用額公×緬漢西=F.I 60天到二整斤
郵資三元或訂購者奉上育雛要領一份

經濟實惠的肥料醱母菌

肥料用 一頓之肥料僅用10%

父母菌

大袋40磅80元·小袋10磅23元

用以農耕·果樹·花卉·魚塢上之肥料

父母菌之效果

- 1 堆肥之醱酵增加肥質。
- 2 改良土質，使土質軟化。
- 3 提高有機質肥料之效果。
- 4 使化學肥料之肥分持續。
- 5 增加水肥之肥分，消滅臭味。
- 6 製造粒肥，減少農作物病害。

各地農會·藥房·農藥行均售 說明書郵資四角備索

台灣總代理·德生貿易有限公司
台南市民權路133號 TEL 2964
總批發·元山製菓廠
台南市復興路10巷42號 TEL 5775
製造元·日本營農協會株式會社

用以稻魚蔬菜花甘藷西瓜菇