

量產證保 · 質品高提

「栽培葛蔓牧草注意五點」

——組牧畜會復農——

攀葛草是營養價值很高的一種牧草，從民國四十六年四月自菲律賓引進以來，已引起本省農友普遍的重視。「攀葛草」雖很適宜本省的風土，可是必需注意下列五點，才能提高品質，保證產量。

施用足量基肥

基肥能够促進幼苗生育，提早覆蓋地面，因此可以減少初期除草次數，提早第一次刈刈日期。

每公頃所需基肥如下：
 ① 氮 氮化鈣二五〇公斤，過磷酸鈣三〇〇公斤，氯化鉀一五〇公斤。或 ② 化成氮磷三〇〇公斤，氯化鉀一五〇公斤。
 基肥要施在植溝中，和土壤拌和後再蓋土約三公分（即一臺寸）。

本省各地攀葛草種植適期如下，請農友們及時準備基肥。

北部——三月一日至十一月一日。
 中部——五月一日至九月十五日。
 南部——六月一日至九月一日。
 東部——祇需土壤濕潤，任何時期均可種植。
 低山地區（一千公尺以下）——四月十五日至九月十五日（一千公尺以上的高山地區不宜種植攀葛草）。

除草保護幼苗

除草要早，在雜草初出現時就要除草。除草過遲，必損失土中大部份的養份，阻碍牧草的生長。等到攀葛草長成以後，如施肥及管理適當，反可抑制雜草生長。在牧草完全覆蓋地面，並直立生長到二十五至三十五公分高以前，決不可以放入家畜。

追施氮磷鉀肥

施用追肥，可以保持攀葛草長久的生產力。如果將牛糞完全施回草地，每公頃每年再施三〇〇公

斤氮素肥料即可。如果不將牛糞施回，每年每公頃要施用八〇〇公斤的氮肥。追肥在青刈或放牧後立即撒施。

此外，每隔一年需再撒用三〇〇公斤的過磷酸鈣和一五〇公斤的氯化鉀。

適時青刈放牧

草高七寸至一臺尺（二〇—三〇公分）時為青刈及放牧的適期。刈割過遲，非但所含養份降低，生長也必受影響。在牧草生長過速時，多餘的草可做青貯料貯藏。

青刈時切不可將葡萄莖拉起刈掉。無論青刈或放牧都不可過度，即不可顯露無草覆蓋的空地。

在生長旺期，每次青刈或放牧後，過三星期便可完全恢復原有高度。如生長速度較此為慢，則



地草葛攀的鎮梅楊察視(左最)輝增陸與(右最)華臺呂會復農

殺菌劑總匯 最老牌，最可靠的農藥！

——日本特殊農藥製造株式會社原裝——

稻熱病特效藥……

西樂生石灰 (セレン石灰) 3公斤裝

西樂生片劑 (セレン錠) 36片裝

西瓜立枯蔓割特效藥……浸漬消毒殺菌劑……

烏斯普龍 (ウスプルン水和劑) 500公分裝

烏斯普龍片劑 (ウスプルン錠) 45片裝

——伴野農藥榮譽出品——

水銀殺菌劑 豐年錠 (ホーネン錠) 30片裝

總經銷處 國泰農藥行


臺中市興中街十三號 電話：4384

早生蘿蔔價錢好



完品黑雪在上在壤經友
全質心白的春氣數半紹
相，不結梅季候介紹
同施空頭花80均研香
品重無98到內適交早
質量苦%好就合配生
優味葉價有，成45
良價生葉頭，斤想各梅全
勝花，不薄以到土係農向豐三已買做農陳是經頁20第閱

過美及大白等長
好四倍，在春季
利放可，在春季
播種期請勿失
農場大農家
三月至四月
會



請用新式製菜機
大圓型製菜機
中圓型製菜機
左鎮上手製菜機
院園△中大圓型製菜機
順隆種子行
郵政劃撥165
路64號(中央戲