

# 量產證保 · 質品高提

## 「栽培葛蔓牧草注意五點」

——組牧畜會復農——

攀葛草是營養價值很高的一種牧草，從民國四十六年四月自菲律賓引進以來，已引起本省農友普遍的重視。「攀葛草」雖很適宜本省的風土，可是必需注意下列五點，才能提高品質，保證產量。

### 施用足量基肥

基肥能够促進幼苗生育，提早覆蓋地面，因此可以減少初期除草次數，提早第一次刈刈日期。

每公頃所需基肥如下：  
 ① 氮 氮化鈣二五〇公斤，過磷酸鈣三〇〇公斤，氯化鉀一五〇公斤。或 ② 化成氮磷三〇〇公斤，氯化鉀一五〇公斤。  
 基肥要施在植溝中，和土壤拌和後再蓋土約三公分（即一臺寸）。

本省各地攀葛草種植適期如下，請農友們及時準備基肥。

北部——三月一日至十一月一日。  
 中部——五月一日至九月十五日。  
 南部——六月一日至九月一日。  
 東部——祇需土壤濕潤，任何時期均可種植。  
 低山地區（一千公尺以下）——四月十五日至九月十五日（一千公尺以上的高山地區不宜種植攀葛草）。

### 除草保護幼苗

除草要早，在雜草初出現時就要除草。除草過遲，必損失土中大部份的養份，阻碍牧草的生長。等到攀葛草長成以後，如施肥及管理適當，反可抑制雜草生長。在牧草完全覆蓋地面，並直立生長到二十五至三十五公分高以前，決不可以放入家畜。

### 追施氮磷鉀肥

施用追肥，可以保持攀葛草長久的生產力。如果將牛糞完全施回草地，每公頃每年再施三〇〇公

斤氮素肥料即可。如果不將牛糞施回，每年每公頃要施用八〇〇公斤的氮肥。追肥在青刈或放牧後立即撒施。

此外，每隔一年需再撒用三〇〇公斤的過磷酸鈣和一五〇公斤的氯化鉀。

### 適時青刈放牧

草高七寸至一臺尺（二〇—三〇公分）時為青刈及放牧的適期。刈割過遲，非但所含養份降低，生長也必受影響。在牧草生長過速時，多餘的草可做青貯料貯藏。

青刈時切不可將葡萄莖拉起刈掉。無論青刈或放牧都不可過度，即不可顯露無草覆蓋的空地。

在生長旺期，每次青刈或放牧後，過三星期便可完全恢復原有高度。如生長速度較此為慢，則



地草葛攀的鎮梅楊察視(左最)輝增陸與(右最)華臺呂會復農

## 殺菌劑總匯 最老牌，最可靠的農藥！

——日本特殊農藥製造株式會社原裝——

稻熱病特效藥……

西樂生石灰 (セレンサン石灰) 3公斤裝

西樂生片劑 (セレンサン錠) 36片裝

西瓜立枯蔓割特效藥……浸漬消毒殺菌劑……

烏斯普龍 (ウスプルン水和劑) 500公分裝

烏斯普龍片劑 (ウスプルン錠) 45片裝


——伴野農藥榮譽出品——

水銀殺菌劑 豐年錠 (ホーネン錠) 30片裝

總經銷處 國泰農藥行


臺中市興中街十三號 電話：4384

### 早生蘿蔔價錢好



完品黑雪在上在壤經友  
 全質心白的春氣數半紹  
 相，不結梅季候介紹  
 同施空頭花80均研香  
 品重無98到內適交早  
 質量苦%好就合配生  
 優味葉價有，成45  
 良價生葉頭，斤想各梅全  
 勝花，不薄以到土係農向豐三已買做農陳是經頁20第閱

### 農場大農家



請用新式如用鐵成  
 大圓型型用製器  
 中上手搖製器  
 左鎮生二種製器  
 院新上二種製器  
 順隆種子行

過美及大白等長  
 好四倍，在春季  
 利放可，在春季  
 播期請勿失難  
 三月至四月  
 農場大農家