






原封農藥供應總滙


 **美國好速牌...**
安特靈(エンドリン)


 **荷蘭農利牌...**
富收多(ホスピドール)

 **美國金霸牌...**
把拉松(バラチオン)
水和硫黃劑 98.5%

 **日本日產化學公司...**
土壤殺蟲劑
(ヘブタクロール 2.5% 粉劑)

 **西德拜耳牌.....**
固殺松(コサチオン)
米賜多(メタンストックスI)
富粒多(ホリドール)
ツーゼット

 **西德開地化學公司.....**
馬拉松25%水和劑

 **美國賜德來植物油公司.....**
蛋白質瓜果蠅引誘餌
(スターレ)

其他各國名廠出品各種農藥均有

直接進口商

東益貿易股份有限公司

臺北市天水路二號之四 電話：43802

中南部經銷處

建南農藥行

嘉義市中山路四五二 電話：2198

新竹區經銷處

明茂農藥行

中壢鎮中正路2號(中壢火車站前) 電話：471


需施化學肥料(尤其是氮肥)。葉片上帶紫色表示缺乏磷肥，出現褐斑表示缺乏鉀肥，都應趕快施用所缺的肥料。

間作豆科牧草

在蕃荳草地中播種豆科牧草，可以提高單位面積草地所生產的養份(尤其是蛋白質)含量。

播種豆科牧草，要在放牧或青刈完了以後立即開始，適宜的豆科牧草有下列幾種：

- ①白三葉草等三葉草類——撒播時期九至十一月，適宜於臺灣中北部地區，多年生，有的一年生。
- ②土豆舅——春夏撒播，一年生，但年年自行由種子萌發，宜於中南部。
- ③甜三葉草——同上。



肥堆下施溝開後地整

- ④毛藍——同上。
- ⑤紫雲英——冬季撒播，宜於濕潤的北部地區，年年可自生。
- ⑥甜魯冰——九、十月撒播或條播，宜於北部酸性紅土丘陵地。

△農業小知識▽

△荔枝也有隔年結果及落花落果現象，應用二，四—D—O—一五〇〇〇噴佈即可防止。此外噴藥防治捲葉蛾及適當疏剪花枝，都有減少落果之效。(兆)

△花椰菜在本省中北部的採種成績不好，且農家自行留種時，常因選取的母本不純良，及採種環境不佳的關係，很難採到純良優秀的種子。農林廳每年都設有採種團專事繁殖花椰菜種，品系純良，價格低廉，所以栽培者不需要自行留種，以向當地農會申請配售較為方便。(郁)

△四耳仔雜草可用二，四—D殺滅，但如果可以購到「惜地愛」(CDA A，參考豐年五卷二十三期)，在潮濕地當較二，四—D有效。(謙)

臺灣農產的優良種子

- 一代交配種
- 三倍性無籽西瓜
 - 二、三、四號 (繪袋原封)
 - 旭都紅肉西瓜 (繪袋原封)
 - 武剛紅肉西瓜 (繪袋原封)
 - 金剛黃肉西瓜 (繪袋原封)
 - 美國皮那那蕃茄
 - 美國馬里那蕃茄
 - 日本大和西瓜
 - 海湖紅肉西瓜
 - 密寶紅肉西瓜
 - 日本紐約木
 - 日本果樹苗木、蔬菜種子均備目錄、價格表函索即寄
 - 米數樂淨、シンメル、マラル、ハイボネックス均備每冊連郵七元
 - ◎洋蘭新高地(一九六〇年七月、二月)均備每冊連郵七元
 - 美國皮那那蕃茄 (繪袋原封)
 - 美國馬里那蕃茄 (繪袋原封)
 - 美國嫩莖高莖 (繪袋原封)
 - 美國葛蘭早生 (繪袋原封)
 - 美國黑種細粉 (繪袋原封)
 - 美國紅長菜豆 (繪袋原封)
 - 美國加州大甜椒 (繪袋原封)
 - 世界一巨大甜椒 (繪袋原封)
 - 美國加州大甜椒 (繪袋原封)
 - 紫紅長菜豆 (繪袋原封)
 - 黑仁青格長菜豆 (繪袋原封)
 - 紅仁白格長菜豆 (繪袋原封)
 - 花心白菜 (繪袋原封)
 - 青江白菜 (繪袋原封)
 - 美國嫩莖高莖 (繪袋原封)
 - 美國葛蘭早生 (繪袋原封)
 - 美國黑種細粉 (繪袋原封)
 - 美國紅長菜豆 (繪袋原封)
 - 美國加州大甜椒 (繪袋原封)
 - 世界一巨大甜椒 (繪袋原封)
 - 美國加州大甜椒 (繪袋原封)
 - 紫紅長菜豆 (繪袋原封)
 - 黑仁青格長菜豆 (繪袋原封)
 - 紅仁白格長菜豆 (繪袋原封)
 - 花心白菜 (繪袋原封)
 - 青江白菜 (繪袋原封)

臺北市迪化街一段86號
臺灣農產資材公司
臺灣農產資材公司
郵劃撥帳號臺灣二七九號