

### 牛蛔蟲病無重大障礙

#### 治療可用「硫二笨胺」

【問】：一、鄙人所飼養的二個月犍牛，頃染患寄生蟲病甚劇，每日早晨大便時有狀類蛔蟲的蟲排出。經查舊刊三卷廿二期七頁「臺灣的牛病」寄生蟲一條，並無蛔蟲名稱，故不知此蟲屬於何類？二、茲敬檢寄「標本」，煩轉請專家鑑定，並示知驅除方法。（屏東縣劉化之）

【答】：你所寄之標本檢驗結果，確係牛蛔蟲一條無錯。惟讀者若覽年報三卷廿二期七頁中所記載的「臺灣的牛病」一篇文章中，說明無寄生蟲云云，使得讀者發生此疑問。筆者認為寫「臺灣的牛病」的筆者和讀者都沒有錯誤。因為牛蛔蟲隨年齡之免疫性較任何其他蛔蟲為強，使成年牛幾無蛔蟲寄生情形。唯限於年齡幼的犍牛，有少數患此蛔蟲病，雖感染此病後也不致於使得牛發生很大的障礙。同時牛蛔蟲的胎盤感染也非常普遍，此種感染的蛔蟲，因年齡免疫性的關係，不驅蟲也自然會慢慢排出體外。故除感染特別嚴重者外，不考慮予以治療。如要驅蟲可用硫二笨胺 Phenothiazine 每公斤體重用0.28g 內服一次即可。（李永基）

### 豬肺炎可用血清治療

#### 管理上注意乾燥暖和管理

【問】：附近鄰居發生豬肺炎，我們養的豬也難免受害。現下有一頭母豬體重八十公斤左右，病狀呼吸困難，氣急。發病以來每天注射配尼微素混合使用，未能見效。又有一頭改良種肉豬，體重一百八十公斤，發病後初給益生素，四、五天後注射配尼微素四支，次日兩支，連注射七八天，又注磺胺四品，病情變重，無法治療。鄰居飼養的豬請獸醫師來診斷為慢性肺炎，無確實治療方法，請貴社詳細指導。（龍潭鄉曾永利）

【答】：你的豬發生豬肺炎應請獸醫注射豬肺炎血清治療，不可隨便用藥。此病當氣候驟變寒冷時，最易發生在管理上應加注意豬舍乾燥，暖氣，避免逆風吹襲，多鋪稻草為墊草，俾使發生此病之機會減少。（李登元）

### 產無毛豬若因缺乏碘質

#### 治療可用飼料加碘鹽法

【問】：一、本村自四九年以來，所養之母豬，常產下沒毛仔豬（不分種類母豬都會產下沒毛豬）

二、所說之沒毛豬，不是沒毛，是豬毛不能生出豬皮面上。沒毛仔豬出生以後，五、六天或一個月，最久沒有過二個月，發育不常，自然地死亡。

三、是否有使沒毛仔豬發毛正常，不至死亡的好辦法嗎？（廣東縣王獎林）

【答】：一、母豬所產的沒毛豬除了遺傳的關係外，亦有因飼料中缺乏碘質所引起。二、因遺傳的關係是無法治療的。只有將這種母豬淘汰。若由於飼料中缺乏碘的話，治療方法可在懷胎母豬背上，每星期塗抹一次碘酒，使母豬吸收體內，以後生產仔豬時，仔豬就不會沒有毛了。另外一種方法將雙料料中加些碘鹽（如碘化鉀，碘化鈉等）碘鹽量為全飼料量百分之〇·五。或每百斤蛋白質補充飼料中加一斤半至二斤的碘鹽。（李登元）

### 家禽癩疾可用癩疾藥治療

#### 為鷄群安全應將病鷄淘汰

【問】：鄙人養鷄十年，最近患染一種怪病，謹將患病情形列左，請予指示。

一、病狀：羽毛微鬆，頭稍縮，驚之，動態與好鷄無異惟食慾不旺，如置之不理，時餘，精神較差，眼微縮，翅稍傾垂，口小張，呼吸緊張，兩腿發軟，不能自主，稍傾，軟麻痺無知覺，輕者蹲臥不動，重者扁臥，兩腿不能伸縮。如服藥，有的二小時便好，並照常產卵，惟卵殼不固，有的兩三天後，仍不能自由活動，但精神與好鷄無異，尤可怪者，將其治好後，不管病症輕重，每於卵形成時，病又復發，所產之卵破爛不堪食用。（停產時無此病）

二、感染時間：早四至五時，晚六至十時，白晝很少發現。三、目前用藥：在兩週以前用安禽素，輕者好後復發，重者無效。隨多方思索，乃改用人服之癩疾藥片（英製

TRADE MARK

東

# 大東牌農藥

製造批發

## 大東化工廠

臺中市西區三民路一段九七七號  
電話：四六七七號

### 地下殺蟲劑

VELSICOL  
HEPTACHLOR

沒用錯了!!  
飛佈達  
井的耕作  
辛苦都  
完了

美國 威力克化學公司出品  
臺灣獨家加工廠 中華山本農藥有限公司  
臺灣總代理商 太安行股份有限公司  
函索飛佈達粉劑使用說明書附郵票四角即寄