

，黃色藥片）較有效力，惟不能根治。（花運唐子俠）

【答】：據你所說的情形，你的雞群的病狀很像家禽瘧疾。可以應用瘧疾藥片治療之。因患此病之雞隻不能一時治療而多為慢性，為其他雞群安全計，以及在經濟之立場，應將此群患有此病之雞隻立予淘汰，以免後患。（李登元）

桑葉可作豬的補充飼料

豬豕可用D D T粉驅除

【問】：一、鄙人常在養蠶期間，發現豬喜吃桑葉，請問桑葉的營養成份，對豬是否有利？二、豬喜吃鮮甘諸藤，何故？三、現發現豬身（皮膚）上有蟲，（附樣品）是何原因？用何藥治療？（枋寮金品三）

【答】：一、桑葉之營養與一樣青飼料之營養相似，可以給與豬隻為青飼料之補充飼料，而對豬隻身體是有益的。二、家畜都比較喜歡吃新鮮，甘諸藤新鮮時給與較煮熟者與為佳。三、你所說豬身體上的外寄生蟲是豬蝨。可應用D D T粉或B H C粉撒擦患部驅除之。第一次驅除後隔十日再施行一次，即可完全驅除。（李登元）

橄欖可以用種子繁殖

播種至結果需三四年

【問】：本人想要種橄欖，可用種子否？什麼時候可以有收成？種植的方法如何？（臺東縣劉明德）

【答】：一、橄欖可用種子繁殖，普通皆於十二月至二月間播種，經七〇—八〇日就可發芽。自播種至結果需三至四年。

二、栽種距離以四公尺正方形為原則。因橄欖生長習性較強，不甚選擇土壤，在苗床期，僅隨時注意灌水，每年可施水肥二次，混合化學肥料（硫酸銨）一、二次。待一、二年定植後，每年每株酌施三要素混合肥料〇·二—〇·五公斤。（王兆全）

為調節油茶成熟期

可將油茶先端摘除

【問】：一、油茶已快要結實，如果把其尖端的花摘掉，對於油茶的成熟，能提早嗎？二、依上列的問題，對於油茶有影響否？（雲林縣廖大木）

【答】：一、為了調節成熟期可將先端摘除約四分之一。摘除先端後當然可以提早收穫。摘除工作需用工資，故增加成本。二、摘除工作須選晴天行之。下雨天不佳，因腐敗菌由摘除處侵入引起腐爛，或引起摘除傷口裂開。（王進生）

陳天化 呂瑞森 楊朝宗 謝博臣
田振霖 曾銀玉 黃茂霖 羅文正
白錫珍 洪宗文 何紹東 陳金次
陳玉珍 王 鑫 梁進登 葉永仁
周梁津 吳振禮 沈宋輝 蕭政彩
邱元秀 陳萬法 李劍峯 鍾德榮
陳瓊輝 吳政雄 連進興 郭文忠
廖泰盛 李 獅 邱光燮 崔志翔
鄭雪耕 曾茶春

以上各農友來信，已轉請專家答覆中，請待本社回音。

大桃花苗木 廉售

春季特價每枝
三元五角
購滿一〇〇枝
免費送到

台慶有限公司

臺中市華南路九十二號之二
電話：二一三〇九
郵政儲蓄部第五六八號

永光農藥 TRADE MARK 信用最好



進口各種名牌農藥

永光農化工廠

台中市成功路276·電話4661

清河特選夏季優良種子

清河改良早生30天曹粉菜
包心白菜子
二尺半長紅仁白格菜豆
幼葉種紅仁白格菜豆
黑仁曹粉菜豆（紅蒂尾）
青皮白刺目瓜（胡瓜）
早生四十日長種馬耳松菜
頭（蘿蔔）
夏播大白松菜頭（蘿蔔）
青皮竹竿長黃麻子
紅皮竹竿長黃麻子
其他各色種在庫均備以及雜穀類歡迎照會特效農藥，大生78，大生22，可利生，殺蟲農藥現貨供應，以及植物荷爾蒙，歡迎賜顧

美國新型大五寸人參子
長岡交配一號甘藍
長岡交配福壽大型トマト
美國大粒甜蕃椒
梨仔瓜（黃香瓜）
柿型トマト
黑仁敏豆
白仁敏豆
青江白菜
八天油甘菜
白杏菜（虎耳葉）
觀音山竹仔甲芥菜
青粉菜格藍菜
想思樹子

正烏龍種大葉怕骨膠菜
尖葉硬骨膠菜
丸葉山東白菜
清河改良大白菜
正粗廣北菘
扁甲芥菜
青甲芥菜
觀音山竹仔甲芥菜
青粉菜格藍菜
想思樹子

清河種子行

嘉義市中正路四八二號
電話：三五八四號
劃檢儲金嘉字第八〇〇三七號

金蓮種子行

中部經銷員林鎮新集菜批發市場口
金蓮種子行劃檢儲金中字第二〇八四五號