




瓜 越




瓜 甜




瓜 南



蒲 扁



瓜 冬



瓜類的整枝技術

王進生

整枝是瓜類栽培上很重要的一個工作，尤其是南瓜、甜瓜、冬瓜、扁蒲、越瓜，及菜青瓜等，更需要有適當的整枝方法，來促進開花結果，增加單位面積的產量。

甜 瓜

- ①在「母蔓」四至五葉時行摘心，以促進「子蔓」伸長。
- ②在數芽「子蔓」中，選留發育良好者兩條，其他的全部摘去。
- ③等到「子蔓」伸長至七至八葉時，在其先端摘心，以促進「孫蔓」的發生與伸長。每一「孫蔓」的第一至二節，都可以產生雌花。

南 瓜

- ①「母蔓」不可摘心，應自然放任。南瓜的第一個雌花，都着生在「母蔓」；日本種着生在第十一至十二節，本地種着生在第十六至十九節。第二個雌花着生在第一雌花的先端第四至五節。
- ②在「母蔓」第一個雌花開放後約十天，「子蔓」開第一個雌花。「子蔓」只留「母蔓」第四節所生的一芽，並向「母蔓」相反方向誘引，使它伸長。

扁 蒲


- ①「母蔓」不可摘心，讓它自然伸長，並留第三葉腋至第六葉腋之間的強壯側芽三個，合「母蔓」計四枝為主蔓，誘引配列四方。其他的「子蔓」（側芽），應在生育初期摘除，以免消耗養分。
- ②等「母蔓」第二個雌花（第一

冬 瓜

- ①等「母蔓」本葉展開六至七枚時，將先端摘心，以促進腋芽的發生與伸長。
- ②由發生出來的數個腋芽中，選留發育強壯的四芽做為主蔓，其他的全部摘去。
- ③四主蔓應向四方誘引，使平均發育伸長。普通雌花即着生在第七至第九節。

！了現出藥新除驅蟲蛔猪
劑製淨拉配比的靠可全安最

藥蟲除猪肥



省農農
省農復林
會農會廳
猪蛔蟲防治計劃
指定藥品
合辦

藥效特治防疫禽
痢白赤炎管氣症蟲球
劑除驅蟲生寄禽家
用作劑無效時全安
劑製納化氣
大最力效久最史歷

素禽保雛安


片禽安蟲除

藥蟲除猪肥

品出廠藥畜農東亞

八二之號七口子蔴鄉欄木縣北臺
號七〇六第郵臺：金儲換制政郵

瓜青菜



個雌花不好，不宜留）及其他主蔓的第一個雌花結果後，可以酌予摘心。
③普通着生在着果部的側芽（「孫蔓」），生育快而強壯的可以留下；其他的留一葉摘除。所留「孫蔓」的第二至三節，有着生雌花的習性，所以在「母蔓」與「子蔓」的雌花，因於開花期受氣候影響或守瓜食害而無法結果時，則可利用「孫蔓」來結果。

越瓜

①在「母蔓」四至五枚時摘心，以促進「子蔓」的發生與伸長。
②「子蔓」只留發育良好的三芽為主蔓，其他的全部摘除。
③等「子蔓」伸長至七十五至九十公分時行摘心，以後即可放任不管。

。雌花都着生在「孫蔓」的第一至二節，但是「孫蔓」生育較差者則不着果。

菜肴瓜

①菜肴瓜（香櫞瓜）的雌花，都着生在「孫蔓」上。應在「母蔓」三十公分處摘心，以促進「子蔓」的發生與伸長。
②由發生出來的「子蔓」中，選留強壯者二芽，其他的全部摘除。
③等「子蔓」伸長至一二至一五公尺時摘心，以促進「孫蔓」發生。

④由二條「子蔓」中選留發育良好的「孫蔓」六至七芽，並誘引到棚上，讓它伸長。「母蔓」或「子蔓」如再發生其他贅芽，應全部摘除。

武田老牌

最新農藥



武田滅菌錠劑

（武田メメル）

蓬萊種在菜種稻熱病
最新特效藥！

安特靈 19.5% 乳劑
（エンドリン乳劑）

武田 マイシン
ペスタン

飛佈達 2.5% 粉劑
20% 乳劑
（武田ヘプタ）

滅爾波爾多-18
（メルボルド-18）

日本武田藥品工業株式會社

農藥總代理 立大貿易有限公司

臺北市太原路55號三樓 電話：48170

識知小業農

△花椰菜最容易和芥藍、甘藍類、花菜苔等雜交，採種栽培時，應與異品種和上面三種茶類隔離一千公尺以上。（郁）
△枇杷的實生苗，必須經過嫁接，接以理想品種的接穗，將來才會結品質優良的枇杷，經過嫁接的枇杷樹，結果年齡提早。（蔡）
△樹薯簽干可以代替甘藷簽豬，煮熟後消化率較高。先用沸水浸一、二小時後再煮，可能較易煮爛。（李）
△純仁花生餅含蛋白質約為三〇%，含殼花生餅含蛋白質約為二〇%。含殼花生餅纖維較多，飼卵雞或肉雞都很適宜。（李）