

適合夏季栽培 莖葉均可食用的

白·花·芥·藍·菜

王進生

白花芥藍菜，是二、三年前才在本省開始栽培的一種夏季蔬菜，可以食用葉部，也可以食用莖部，無論專業栽培或家庭食用都很適宜。

白花芥藍菜比其他甘藍類耐熱，病害也較少，為了增加本省夏季蔬菜的供應，請農友們多多栽培。

選地

夏季驟雨多，容易引起積水之害，所以應選擇排水良好的砂質壤土或壤土栽培。在微酸性及中性土地，都能生育良好。夏季白天溫度較高，土壤通氣良否影響生育很大，所以，以前作曾經施過多量有機肥的沖積土壤最為適宜，根朽病發生亦少。

整地

播種前，每十公畝地（一分地）宜用四〇%「阿特靈」六百分殺除地下害蟲。如前作會施用多量堆肥，則不須再施堆肥。十公畝地標準基肥用量如下：

腐熟鴨糞或鷄糞 四百公升
過磷酸鈣 十五至二十五公升
氯化鉀……………十至十二公升

以上肥料混合後，均勻撒佈全園，然後耕犁。耕犁後再澆酒腐熟人糞尿六百至七百二十公升，等土壤吸收後才把平做畦（條播時可採用條施）。為了避免畦面被驟雨沖蝕，以採用畦寬三至四公尺的平畦為宜。



純系白花芥藍菜

採收 白花芥藍菜在播種後五十至六十天就可收穫。採收方法有二種：一為整株拔起，除去木質化部分後出售。另一為分段採收；即自苔中段嫩的部分切斷，捆成小把出售。殘株再經肥培後可繼續發生側芽

播種

從四至六月及八至九月之間均可播種。十公畝地播種量，條播時為二百公分左右；撒播時為二百五十至三百公分。

四至六月播種者可直播。八至九月播種者，須先育苗後定植。播種前，種子宜先用「鳥斯普龍」一千倍液浸漬三十分鐘，或用五百分之一「賜保根」拌種消毒亦可。播種後用「土糞」或細土覆蓋，再用稻草疎蓋，以免畦面被雨水沖蝕，並保持濕度以促進發芽。發芽後稻草不必除去，使幼苗

從草間伸出生長即可。

管理

等本葉展開二至三枚時，將過密苗株間拔，使株間保持十公分左右的距離。間拔時應兼行除草，同時施用稀薄的腐熟人糞尿或尿素液，作為第一次追肥。土地過乾時，宜於傍晚時舉行噴酒灌溉。條播者宜澆水於行間。

氣溫超過攝氏三十五度時，對氮肥的吸收能力減低，所以應在噴射殺菌劑如「大生」等時，加入尿素行葉面噴射，濃度為〇.二至〇.三%（濃度超過〇.三%以上則會引起傷害，須注意）。以後如能繼續用上述濃度的尿素作葉面噴射，則可促進生育提高品質。

臺灣省總代理

德記洋行

臺北市長安西路303號
(電話：(44968, 45214))

高雄分公司：新樂里大仁路31號
(電話：3756)

基隆分公司：忠一路17號
(電話：447)

宜蘭聯絡處：中山路191號
彰化縣聯絡處：溪湖鎮光華里
135號 三信行

臺南縣聯絡處：臺南市民樂街
118號 錦興農具廠

特點

最適合農
於農、茶園、
菓園水稻、
旱畑

分期付款

手續簡便利
息特低
「付款辦法
函索即寄」

“曳引及迴轉兼用式”

英製地霸王牌耕耘機



四匹半至六馬力 現貨供應



每臺 NT\$19800.00
(包括水田作業各配件)

優點

耐用可靠
操作方便
強力省油
故障極少

示範表演

歡迎預約
實地示範
表演

(地霸王耕耘機犁耕圖)

栽培洋菇要有保證契約

加工廠只收「白王」品種

，等側芽成爲小苔後可再採收。
如無輪作需要或自給栽培時，均可採用後法。
專業者則多採用前法。

病蟲防治

在本菜二至三枚時，宜噴射二
五% DDT 乳劑五百倍液，以

撲滅菜心螟及夜盜蟲等。生育中期宜噴射「馬拉松
」二千倍液。

此外，最好在本菜二至三枚時開始噴射「大生
」四百倍液，並加用〇.二至〇.三%的尿素液，繼
續二至三次。

洋菇生產季節剛過，距離冬季的栽培時期，還有大半年的時間，可是我們知道，許多
農友都已開始預訂菌種，準備冬天一到，即大量種植，因爲今年洋菇外銷的情形，是空前
的「景氣」。 (參看本期畫刊)


洋菇在本省栽培成功，還是最近的事情。可是因爲許多種洋菇的人，缺乏生產的計劃
，以致產品無法脫售，遭受損失。農復會爲了保護這一新興作物，乃在去年冬間，與四家
洋菇加工廠合作，在十三個鄉鎮舉辦生產與加工配合計劃，由農會以每公斤十四元五角
價格，代理工廠與農民訂立生產契約，結果，使農友與工廠雙方都得到很大的利益。到目
前爲止，報銷外銷的洋菇，已達五萬多箱。同時，許多小加工廠看到外銷順利，也紛紛搶
購原料。這就是造成此次「景氣」的最大原因。

現在讓我們來眺望今冬的洋菇「景氣」又將是怎樣的？據農復會李秀技正告訴記者稱
：由於去年生產加工配合計劃的成功，農復會已決定自明年起，實施洋菇的計劃生產。
農友們在種植洋菇之前，應先透過農會與加工廠訂立保證契約。等到洋菇收穫時，亦應
經由農會交給指定的工廠加工。這樣產製
兩方妥爲配合，當然不再會有生產過剩，
產品無法脫售的情事發生，農友們栽培洋
菇的利益，也就有保證。

大家都知道，洋菇品種可大別爲褐色
與白色的兩類。在褐色與白色的兩大類中
，又有許多不同的品系。其中，最適合
製罐外銷的，就是白色品種中的「白王」。

所以，李技正又補充說：農友們在與農會
訂立契約之後，仍應注意向可靠菌場選購「白王」種菌
種，才能使產品符合加工廠的要求。「白王」具有被膜不
易裂開，不易變色，產量較高優良的特性，所以，對於
栽培者來講，也是理想而有利的一個品種。據悉，在本
(五)月初旬以前，經濟部工礦計劃聯繫組將會同農復會與
檢驗局等有關單位，調查各菌種場的設備與種菌等，以供
農友們採購菌種的參考。

你準備在今年冬天種植洋菇嗎？請立即與當地農會聯
繫，並且一定要選種「白王」品種。(阿明)



最適加工外銷的「白王」種洋菇




大生二十二防治 大豆紫斑病及銹病

各區域大豆常發生紫斑病，中部最爲普遍
。可終年發生，夏季最爲嚴重，雨量增加常助
長本病發生。

被害以葉片，豆莢及種子較爲顯著。患部
後期均爲紫褐色，是名紫斑病。葉部病斑多呈
不規則多角形。罹病葉上病斑多爲大形，甚或
多數病斑相接近，使葉片早枯死。種子被侵害
時，種皮上形成紫紅色病斑。本病嚴重時種皮
表面全部悉呈紫褐色。受侵害較早者種皮常發
生橫走龜裂現象。

在幼苗期間可受侵害，但多發生於開花期
後，是以防除應着重於大豆發育後期，尤以豆
莢充實期最爲重要。



大生二十二可濕性
粉劑三磅裝原國美

播種後五十天有本病發生時，用大生二十
二四百倍稀釋液，每公頃八百公升，計每次用
大生二十二四磅半。每十四日噴撒一次，連續
五次。可增加產量四成半，約五百四十公斤。
大豆每公升價值七元，即三千七百八十元。大
生二十二藥劑按每磅四十元計算，共用五次每
頃總共二十二磅半即九百元。淨增收入每公頃
可達二千八百八十元正。

大生二十二亦能防治銹病。防治大豆銹病
係與防治紫斑病在同一時期，撒佈大生二十二
可同時防治紫斑病及銹病。甚爲經濟。

臺灣總代理 青象貿易有限公司

臺北市中正路一七五六號三樓
農素農業說明書附郵票八角即寄