

適合夏季栽培 莖葉均可食用的

白·花·芥·藍·菜

王進生

白花芥藍菜，是二、三年前才在本省開始栽培的一種夏季蔬菜，可以食用葉部，也可以食用莖部，無論專業栽培或家庭食用都很適宜。

白花芥藍菜比其他甘藍類耐熱，病害也較少，為了增加本省夏季蔬菜的供應，請農友們多多栽培。

選地

夏季驟雨多，容易引起積水之害，所以應選擇排水良好的砂質壤土或壤土栽培。在微酸性及中性土地，都能生育良好。夏季白天溫度較高，土壤通氣良否影響生育很大，所以，以前作曾經施過多量有機肥的沖積土壤最為適宜，根朽病發生亦少。

整地

播種前，每十公畝地（一分地）宜用四〇%「阿特靈」六百分殺除地下害蟲。如前作會施用多量堆肥，則不須再施堆肥。十公畝地標準基肥用量如下：

腐熟鴨糞或鷄糞 四百公升
過磷酸鈣 十五至二十五公升
氯化鉀 …… 十至十二公升

以上肥料混合後，均勻撒佈全園，然後耕犁。耕犁後再澆酒腐熟人糞尿六百至七百二十公升，等土壤吸收後才把平做畦（條播時可採用條施）。為了避免畦面被驟雨沖蝕，以採用畦寬三至四公尺的平畦為宜。



純系白花芥藍菜

採收 白花芥藍菜在播種後五十至六十天就可收穫。採收方法有二種：一為整株拔起，除去木質化部分後出售。另一為分段採收；即自苔中段嫩的部分切斷，捆成小把出售。殘株再經肥培後可繼續發生側芽

播種

從四至六月及八至九月之間均可播種。十公畝地播種量，條播時為二百公分左右；撒播時為二百五十至三百公分。

四至六月播種者可直播。八至九月播種者，須先育苗後定植。播種前，種子宜先用「鳥斯普龍」一千倍液浸漬三十分鐘，或用五百分之一「賜保根」拌種消毒亦可。播種後用「土糞」或細土覆蓋，再用稻草疎蓋，以免畦面被雨水沖蝕，並保持濕度以促進發芽。發芽後稻草不必除去，使幼苗

從草間伸出生長即可。

管理

等本葉展開二至三枚時，將過密苗株間拔，使株間保持十公分左右的距離。間拔時應兼行除草，同時施用稀薄的腐熟人糞尿或尿素液，作為第一次追肥。土地過乾時，宜於傍晚時舉行噴酒灌溉。條播者宜澆水於行間。

氣溫超過攝氏三十五度時，對氮肥的吸收能力減低，所以應在噴射殺菌劑如「大生」等時，加入尿素行葉面噴射，濃度為〇.二至〇.三%（濃度超過〇.三%以上則會引起傷害，須注意）。以後如能繼續用上述濃度的尿素作葉面噴射，則可促進生育提高品質。

臺灣省總代理

德記洋行

臺北市長安西路303號
(電話：(44968, 45214))

高雄分公司：新樂里大仁路31號
(電話：3756)

基隆分公司：忠一路17號
(電話：447)

宜蘭聯絡處：中山路191號
彰化縣聯絡處：溪湖鎮光華里
135號 三信行

臺南縣聯絡處：臺南市民樂街
118號 錦興農具廠

特點

最適合農
於農、茶園、
菓園水稻、
旱畑

分期付款

手續簡便利
息特低
「付款辦法
函索即寄」

“曳引及迴轉兼用式”

英製地霸王牌耕耘機



四匹半至六馬力 現貨供應



每臺 NT\$19800.00
(包括水田作業各配件)

優點

耐用可靠
操作方便
強力省油
故障極少

示範表演

歡迎預約
實地示範
表演

(地霸王耕耘機犁耕圖)