

麸皮 一〇〇
 米糠 一五〇
 大豆餅(或花生餅) 二五〇
 魚粉 五〇
 貝殼粉 二〇
 骨粉 一〇
 混合鹽 〇.五
 另魚肝油 數滴
 附註：混合鹽是在一百公分食鹽中加無水硫酸錳一.七公分混合而成的。
 肉用鴨平均飼養到十星期，體重約達二.五公斤時，即可出售。普通依照雛鴨的生長情形和季節的不同供應市場的週齡約為八至十一星期。
 在此時期每喂四到四.五公斤飼料，便可長肉(屠後體重)一公斤(若以毛重計算則為三至三.五比一)。
 在管理上每批雛鴨出售後，育雛舍及其用具應清潔及消毒一次，第一批雛鴨即使發生疾病或寄生蟲，也不會傳染給第二批雛鴨。

收支記錄

每批雛鴨的飼養，其收支情形均應加以記載，如出售飼養期間，體重，飼料消耗，管理費用及其他支出以及價格，與收入等等，不但可以計算成本，並能藉此記載資料，作為將來改進的參考。

疾病的預防

在肉用鴨的飼養管理上，以保持衛生為最重要。雛鴨應和成鴨分開飼育，鴨舍要保持清潔乾燥及常更換墊草。
 如有病鴨應即隔離。並將病情報告當地獸醫或診斷所。
 取出病鴨後，鴨舍應即徹底消毒，發生傳染病的鴨隻，必須宰殺後深埋或燒却。
 因肉用雛鴨飼養期短，只要在飼養管理上加以注意外，並不須要施行預防注射。
 種鴨則應定期約請獸醫注射家禽霍亂疫苗，以保安全。
 附註：本文轉載農復會推廣教材，李登元先生原著。

農業小知識

△母豬養得太胖，乳汁分泌能力就差了。飼養母豬除了在懷孕期內外給富蛋白質的補充飼料、青飼料及鑛特質骨粉一%，食鹽〇.五%外，應使母豬有充分運動的機會。(李)
 △鳳梨植株幼小時，對施肥的反應遲鈍非常。當定植後到了第一個夏季，溫度很高，濕度很大，這時鳳梨植株發育很快，最需要肥料，這時若能每隔一、二月施少量肥料(偏重於氮鉀肥料)，很能促進植株發育壯大。(蔡)
 △十月以後，本省中南部雨水很少，鳳梨此時可施固體肥料(秋肥)，如無雨水，植株無法吸收利用，施肥毫無效果。(蔡)
 △鳳梨植株從九、十月起開始形成花芽，這時應該多量施肥(偏重磷肥)，所以秋肥應該在雨季終了以前施下，此點非常重要。(蔡)
 △育雛溫度調節器內所裝的乙醚(Ether)，此藥揮發性很大、尤其在溫度較高時。自己要裝時，以注射筒帶針頭注入調節器的小孔內，然後將小孔鋸起來。裝入時應在水塊中進行。(李)

中華植物保護技術學會鄭重推薦

稻熱病特效藥!!



適用病害：稻：稻熱病、小粒菌、核病。小麥：赤銹病、株腐病。蕃茄：葉霉病、褐斑病、瓜類：べ卜病、炭疽病。白菜：白斑病、黑斑病。玉葱：べ卜病、葉枯病。薄荷：赤銹病、其它蔬菜病害。

優點：殺菌力強

、防治多種病害、不受氣候條件影響、懸浮性良好、耐光性強、不被濕雨沖失、藥性持久、調法簡便、不損器材、具有促進生育作用、不必加展着劑價錢低廉使用便宜。

土壤殺菌劑!

西瓜黃瓜及其他瓜類之蔓割病! 蔓枯病!

收祿生 100c.c. (Soilcin E.C.)
(ソイルシン乳劑)

多年栽培的柑桔紋羽病，裙腐病，蔬菜蕃茄之立枯病蔬菜，落花生之白絹病，預防時使用2000倍稀釋液灌注(治療時用600倍液塗抹。

總代理 **大勝貿易有限公司**

臺北市太原路20號
 電話：45877號