

# 瓜越仔糊好種樣怎

## 田秋謝

本省中南部稻田，在第一期作收穫後，至第二期作插秧之前，有着一段空間的時間，在這時間裡，栽培糊仔越瓜最為適宜。近年來，糊仔越瓜的栽培面積已逐漸擴大，但是在栽培技術方面，還有許多需要改進的地方。

越瓜生育期短，產量高，在中南部第一期稻作與第二期稻作間糊仔栽培收益很大，可是在栽培管理上，必需注意下列的幾點：

### 「金線」種

#### 最受歡迎

目前本省越瓜品種，以「金線」種較受市場歡迎。「黑皮種」大都供製醬瓜之用，價格稍廉。因此，以選植「金線」種較為有利。

近來，有的商人以混雜的種子，充當優良種子出賣，致使栽培後生育參差不齊，產量不高。

所以，種子最好向試驗機關或歷年栽培有經驗的農友洽購。如能自己留種則更可靠。

### 移植栽培提早收成

糊仔越瓜，以往以直播法較為普遍，但以採用移植法較佳。

移植法是先設置苗圃育苗後，再移植於稻田，優點是可提早越瓜的開花結實，早半個月收成，爭取早期市場。

水稻收穫前三十日左右，先在田旁擇一塊空地，利用鋤頭細耕後，澆

水達到飽和狀態，耕鋤至將成土泥時為止，然後做成如茶畦的畦，再用模型器（利用鉛片由錫粘成長寬皆二台寸，深一吋的長方形印型器）制成方塊，隔日將種子播於方塊上，每塊一粒即可。每分地須印方塊四百八十五百塊。

種子播後須覆蓋堆肥，並保持濕潤狀態。任瓜苗發芽生長至水稻收穫前十二至十五日左右，仿直播法將瓜苗移植於田間的土堆上，每堆種三株。

### 基肥追肥適時施用

**基肥** 每分地施堆肥二千台斤，硫酸銨二十台斤，過磷酸鈣五十台斤，氯化鉀四十台斤。

堆肥作為覆蓋種子之用。化學肥料三種混合均勻後，於播種前施於小土堆的小穴中，以供幼苗發根伸長後吸收利用。

**追肥** ①硫酸銨每分地三十台斤，分三次施用；第一次於小培土後，第二次於大培土後，第三次於開花結實時施用。

②如有足量的人糞尿（或豬糞尿），可施於離越瓜根部二台尺處，每一星期施一次。

③利用氮、磷、鉀（鳥肥）與堆肥混合，於大培土前施於小培土後的畦畔上，然後行大培土覆

蓋，肥效持久而良好。

### 日常管理注意五點

①水稻收穫後，須立即移開田間稻草，以免影響瓜苗初期生育。


②越瓜的生育，與培土的早遲成正比，愈早培土，生育愈速，所以，稻作收穫後，立即行小培土，隔十日後再行大培土作畦。

③越瓜忌過早與過濕，應隨時注意澆排水。畦間的排水溝應保持適當的水分。過旱時引水灌溉，下雨時即刻排水，以免浸水腐爛。


④為促進越瓜的早期開花結實，於越瓜蔓長一公尺時，行第一次摘心，以後每隔一星期行一次，共三至五次，可促使分枝開花結實，提高產量。

⑤越瓜的蔓葉約一公尺時，必須於畦上鋪稻草，以免瓜果與土壤接觸而腐爛或被地下害蟲蛙食為害。

越瓜自種植於田間後二十至二十五日即行開花。開花後二十日左右即可收穫，瓜重在一·五台斤左右時肉質幼嫩，最受市場歡迎，售價也高。所以須及時收穫，不可留得過久而變老化。



苗瓜植移塊土培



圖苗瓜越

### 德豐牌自動式碾谷米機

本社為響應政府推行農村機械化的政策，及適應農友們的需要，近時研製小型自動式碾谷米機其特點如下

1. 利用電燈即可。
2. 無電力之農村，可用柴油發動機，或耕耙機（鐵牛）替代。
3. 稻谷二五斤，直接碾成白米，只需十八分鐘。
4. 碾成之白米，絕不破碎不沾米糠。如蒙賜顧，當竭誠服務。

國內外總代理

中國華義貿易股份有限公司

總公司：臺北市延平北路二段一二五號 電話四三八八四號

德豐工程社 工廠 豐原鎮中山路五十四號

電話豐原五七二號乙



### 林永旭荔枝苗園

臺中縣潭子鄉頭家厝中山路10號

敝園為酬謝顧客愛顧，將以特價優待直接來園訂購者，敬請撥駕來園參觀，指教，毋任歡迎。

本園荔枝苗現有尺數如下

- 2尺上、下 3尺上、下 4尺上、下 5尺上、下 6尺上、下  
7尺上、下 8尺上、下 9尺上、下 10尺以上均有