

(蟲幼：右，蟲成：左) 蔗螟白蔗甘

甘蔗病蟲害防治新法

本年度植物保護推廣委員會，對於甘蔗矮化病與露菌病的防治方法，已作部份的修訂，對於甘蔗鳳梨病和白螟蟲，也各新頒了防治法。

甘蔗矮化病

苗圃用的蔗苗，應以攝氏五十度溫水浸苗二小時，或以攝氏五十四度熱氣處理八小時後種植。

臺灣公司已在各蔗區設立特約苗圃，其所用蔗苗，即係會用上述方法浸苗加以繁殖者，採用該項苗圃所採的蔗苗種植，即可避免矮化病的損害。

甘蔗鳳梨病

感病性品種(如F一四六)的蔗苗(雙芽苗)，於調苗後立即用〇·


二%「谷樂生」液或「愛樂生」液浸漬約二十秒鐘，取去瀝乾，然後種植。
 ①種植抗病品種(如PT四三—五二及F一四一—等易感病品種禁止栽培)。

②徹底拔燒病株。

③不用病株或由病園採苗。

蜂保護器內，如田間仍有枯心發生，則以人工割除枯心，殺死莖中幼蟲。註：其他甘蔗病，如甘蔗蚜、甘蔗金針蟲、甘蔗龜等，均無修改。

④玉米露菌病亦應一併防治。於每年九至十一月，幼蔗白螟蟲卵塊發生盛期時，常巡視田間，發現白螟卵塊，即將附葉剪下，收集放入寄生



蔗病病梨鳳梨甘

葉病病菌露蔗甘

中華植物保護技術學會鄭重推薦

稻熱病特效藥!!

北興
 富米農
 錠劑

適用病害：

稻：稻熱病、小粒菌、核病。小麥：赤銹病、株腐病。蕃茄：葉微病、褐斑病、瓜類：べ卜病、炭疽病。白菜：白斑病、黑斑病。玉葱：べ卜病、葉枯病。薄荷：赤銹病、其它蔬菜病害。

土壤殺菌劑！

西瓜黃瓜及其他瓜類之蔓割病！蔓枯病！

收綠生乳劑 (Soilcin E.C.)
 (ソイルシン乳劑)

最廉價而效果確實之土壤殺菌劑
 被土壤吸收量最少之殺菌劑，故在土壤中可發揮強力之殺菌效果。
 對作物完全無藥害，不但可以治病，且可達增收效果。

多年栽培的柑桔紋羽病，裾腐病，蔬菜蕃茄之立枯病，蔬菜，落花生之白絹病，預防時使用2000倍稀釋液灌注(治療時用600倍液塗抹)。

總代理 大勝貿易有限公司

臺北市太原路20號
 電話：45877號