

【答】一、劉農友寄來標本是「野蟲」為害，可用一千倍馬拉松乳劑噴佈防治，唯該枝條葉片已呈捲縮，藥液恐難到達，故最好能將捲縮之枝條葉片剪除燒毀，以免傳染。至於已萌茁果，對噴藥不會影響（指使用馬拉松一千倍藥劑）。

二、葉農友附來標本是「野蟲」為害，防治法同前。該蟲易於傳播，且每年會發生多次，應及早防治。（莊德榮）

防治苦瓜炭疽病為害
用大生水溶液有效

【問】我們村上每戶種苦瓜，但是到陰曆三、四月之間，就發現這種黃葉病害，收成減少。（彰化縣邱德毅）

【答】據寄來苦瓜病害標本，係被「炭疽病」所為害，用大生七十八或二十二（四百倍）水溶液是有效的，但施藥時須注意葉片之表背面應均一噴藥，否則難以得最有效的結果。（簡錦忠）

預防胡麻病害

宜行種子消毒

【問】一、近來我種了一些胡麻，迄今已十多天了，但尚未發芽，請問何以發芽如此慢？二、本省南部有何品種（胡麻）較為適應？三、請指示胡麻的管理法。（臺南縣許水德）

【答】一、今年三月之氣溫較往年為冷，故其發芽速度為慢。胡麻之發芽最適溫為攝氏三五度，但普通於攝氏二十至三十度之間約一星期就開始發芽，俟氣溫上昇後數天內尚未發芽，可能不再發芽。

二、適於本省南部栽培之胡麻品種為嘉善黑胡麻種。

三、胡麻之管理要點如左：

①於發芽後一星期內，再行一次間拔，使株與株相距五至六公分，再經二十天行第二次間拔，使株與株相距十五至二十公分左右。於第一次及第二次間拔時兼行中耕除草。

②肥料普通全數作基肥，但在集約栽培時，宜於第二次間拔中耕除草，施行追肥。

追肥之肥料，宜用腐熟人糞尿，或豬糞尿，每十公畝施三六〇公斤左右就可。

③為預防炭疽病及葉枯病宜將種子消毒將種子浸漬於一千倍之水銀液約液三十分鐘，或用西藥生〇·三%作粉衣消毒，並避免備用氮肥，注意三要素之配合。

於發芽後二星期開始噴射四一四式石灰波爾多液，繼續二三次，預防細菌性斑點病及葉枯病之發生，若有發生青枯病之開場不可連作。其開場若可改作水田，宜改作水田一年後再栽胡麻。（王進生）

臺灣生產的蔬菜

可自由銷售澎湖



【問】一、臺灣之蔬菜可否自己配送到澎湖出售，是否有限制？二、如能由自己自由配送到澎湖，是否亦應受海關之檢查？三、如能由自己自由配送，是否要辦理任何手續，其手續方法如何？四、如能由自己自由配送，其交通工具是否應受限制，應如何辦手續？（彰化縣黃芳芳）

【答】一、臺灣產的蔬菜可以自由銷售澎湖，無何限制。

二、出港前須受海關檢查。

三、須要辦理規定手續。

四、公民營交通運輸船隻均可搭裝。至於詳細手續及規章等，此處亦不詳，仍請逕詢高雄或基隆港務局（陸之琳）


秋季番茄病害較少

產量頗高不會減少

【問】：秋季番茄，不知道是否，會使番茄萎黃嗎？所植下之番茄產量會減少嗎？還有關於定植後之番茄追肥應在那一時期？施用肥料應用那種肥料配合比較適當？怎樣來管理，產量才會增加？（頭份鎮劉良定）

【答】：一、秋季青枯病（萎黃）發生少，因青枯病菌於攝氏十八度以下無法活動，發

大同電扇



大同電扇
創造利潤分享顧客，東西好又便宜。服務最週到，設有十六處服務站及巡迴服務隊到各地免費修理。

大同電扇
工廠最大，歷史最久，信用最好，大同電扇保證品質安心使用，要買電扇，請買最老牌最有信用的大同電扇

各地農會
現依農貸
辦法優待
供應大同
電扇請各
位先生多
多利用

五十年
大同電扇
目錄及一
大同彙集
一月刊兩
索即奉寄

大同製鋼機械股份有限公司
臺北市中山北路三段二十一號