

生最烈是在霜氏二五度至三三度範圍內。二、秋季番茄莖葉頗高，產量不會減少。三、番茄定植後之追肥，應依照左列方法施行。

第一次 定植後七日在根間掘穴，將尿糞五公升或硫酸銨十公升溶入豬糞尿施下（豬糞尿十公畝一五磅），然後覆土。

第二次 定植後三十日，在行間用鋤頭作淺溝，施下尿糞六公升及氯化鉀八公升。

第三次 定植後五十至六十日，在初收期中視生育及結果情形，在行間施下尿糞六公升與氯化鉀六公升。（王進生）

東部可以種植香茅草 須配合水土保持方法

【問】一、在臺灣東部墾荒地種植香茅草利於如何？二、出產之香茅油應與那種機構運銷出售？三、前途如何？（士林鎮潘文聲）

【答】就以香茅草之適應性而言，東部可以種植。就水土保持之立場言則應慎重，凡坡度不大之地，可以配合適當之水土保持方法合理經營，坡度太陡之地仍以不種為宜。

二、目前臺灣無論東西部均有許多茅油商活躍購買香茅油，不需向那一個機構運銷。如應週一時找不到茅油商時，可洽請所屬農會代為介紹出售。

三、香茅油國際需要量約有一定，因此臺灣香茅油產量如維持一定則價格不致大跌，但如產量超過國際需要時，則無法保障一定價格。（陸之琳）

去年剩下油菜種子

密封貯藏發芽尚好

【問】：去年農會配給的油菜種子用不完的留在今年再用，是否可以？（鹿港鎮七石）

【答】：去年剩下之油菜種子若貯藏於密封之鉛桶或其他密封之容器，其發芽率尚佳（約七五%左右）若放置於室內（布袋裝）其發芽甚差，不用為宜。使要用它必須於播

種前舉行發芽率試驗，決定其單位面積播種量。（王進生）

香蕉施肥方法 施於根部附近



【問】關於香蕉施肥之關係，香蕉施肥時，是不是施到根才有益處？如果不施到根是否無效？在何時施肥最適當？（南投水裡廖福有）

【答】香蕉施肥應施於香蕉根部末端附近。末端部份根毛（即細根）較多，吸收力最強，在植株幼小時，施肥應施在距植株二十至三十公分的地方。後依植株的長大，施肥距離植株漸遠（約三十至八十公分）。

施肥適當時期，山地栽培者，第一次以二至三月下雨後，土壤不太乾燥時為宜，第二次應在五至六月；第三次在九月雨季剛停止，土壤不太乾燥時為宜。平地可以灌溉的蕉園，如生熟香蕉者，宜於六月施少數肥料，入至十二月分三至四次施肥，依季節蕉之不同，施肥期亦略有不同。總而言之，無論山地或平地，主要施肥期，應在香蕉抽花苞前二個月以前（即花芽形成以前），施下大部份肥料，才可增加結果數與指數，如花芽形成以後施肥，僅可增進果實之大小而無法增加其數目。（朱慶國）

香蕉發生萎縮病 將病株掘起燒毀

【問】：一、在連續三年內，我們蕉園發現三株香蕉葉端吐二到四個果實，但一出來，果實不見得良好果實短小，有些甚至能上市，但四種就無法上市了，此是否為新品種或是突變呢？二、一蕉園中，有時發現幾株中途停滯生長，植株葉片狹小萎縮，很像將要死去。如留其殘株如是如此，此種是何病態，有何補救方法？（屏東縣陳天化）

【答】：一、在香蕉園中發現結果二到四種香蕉之植株為一種變異，在屏東一帶多有發現，嘉義農業試驗所曾引進該變異植株之吸芽試種，經多年觀察，有的植株可結二到

清河特選夏季優良種子

早生30天青粉菜包心白菜子
長岡交配一號甘藍菜子
二尺半長紅仁白格菜豆
目豆（紅仁白格幼菜菜豆）
黑仁青格菜豆（紅落尾）
青皮胡瓜（目瓜）
黑仁嫩豆
白仁嫩豆
青江白菜子
十八天油甘菜子

新加坡大白菜子
鳳山改良大白菜子
清河改良大白菜子
黃金白菜子
早生四十日長種馬耳松菜頭子
冬瓜白菜類子
（夏季用）大白松菜頭子
梨仔瓜子（黃香瓜）
海胡仔紅肉西瓜子

大粒甜蕃椒子
柚型トマト子
扁圓型豆仔薯（刈薯）
正鳥龍種大號藤菜子
尖葉藤菜子（虎耳菜）
白杏菜子
扁甲芥菜子
竹仔甲芥菜子
冬瓜子（黑皮金線）
苦瓜子（粗米半頭）
菟瓜子（冬瓜青）

清河種子行

嘉義市中正路四八二號
電話：三五八四號
劃撥儲金嘉字八〇〇三七號

好消息!! 雞白痢特效新藥出現了!!

英國卜內門公司榮譽出品



‘福利來’

防治雞白痢

雞白痢及其他家禽疾病特效新藥



用法
治療用：配合飼料
一、二倍
預防用：配合飼料
四、四八倍
供飼餵



總代理：英商卜內門有限公司
臺北市中正路一八〇〇號 電話：二六六九〇
經銷處：永生西藥行
臺北市中山北路一段一二四號 電話：四二四七六

各地藥房、飼料行均售
說明書函索即寄