

痘鷄防苗疫種接

——紹永沈——

鷄痘的發生，並沒有一定的時期，但是在氣候較熱的季節，比較容易發生。預防鷄痘最好的方法，就是接種鷄痘疫苗。

鷄痘是不可輕視的一種鷄傳染病，病原是一種「過濃性病毒」，每到晚春初夏，鷄痘的發生也就逐漸增加。

鷄痘一般病徵

受到鷄痘病毒侵襲的鷄，多於無羽毛被蓋的部份，如鷄冠、嘴的基部、肉垂、臉部、眼睛周圍等處，開始發生疣狀小結節，最初呈含有透明液體的水疱或呈大小不等的痘狀隆起，而漸次向周圍擴大。至惡性時，整個鷄冠、肉垂、眼睛，均會被疣狀物所掩沒。

但這些患部如無惡性細菌併發，即逐漸變乾，二星期後呈褐色至黑褐色的痂皮，再經二星期後則自行脫落。

在發病期間，鷄的發育及產卵均會停止，體質惡化。本病發生後，往往於短期間內波及全群。

治療不如預防

本病的治療，不如預防的有效，事實上也沒有一隻一隻治療。如有必要時，可剝去痂皮，塗用「克遼林」(Creolin)軟膏，其製法為取克遼林二至五公分加凡士林一百公分煉成軟膏。或塗用碘酊或抗生素軟膏亦可。但是處理時需嚴格消毒術者的手指及所用器具。

怎樣接種疫苗

鷄痘疫苗，是以鷄痘病毒接種於孵化中的鷄蛋中，使鷄胚胎發病而製成的活毒疫苗，呈粘稠微有臭味的褐色乳劑，用於預防鷄痘。

其用法為選大腿內側，拔去羽毛二十至三十根，再以本疫苗反覆塗擦，但不可使其出血，以免影響發痘。

經本疫苗接種而發痘的鷄隻，約於二星期後即發生免疫效力，有效期間可達四個月。

本疫苗的使用上，須注意下述各點：
(一) 接種時需先將藥液搖盪均勻。

(二) 注意疫苗之有效日期，過期的已無效。

農業小知識

△鳳梨的多冠芽和雞冠芽，是遺傳的性狀，由此繁殖的後代，大多結多冠芽或雞冠芽的果實，所以不宜從這種植株上採苗。(蔡)

△「多冠芽」這個劣性，必須在植株發育旺盛的時候才能表現。發育旺盛的冬果植株，通常生吸裔芽很少，所以多冠芽性狀很容易表現出來。(蔡)

△「開英」種鳳梨的突變不斷發生，它的各項性狀很難固定。所以選種工作須繼續不斷進行，不可中途停止。優良種苗推廣到了農家，仍應由農民繼續選種，種苗才不致退化。(蔡)

豐收可靠的秘訣請使用

綜合微量要素葉面散布劑

施葉養元

シオヤゲン

農作物等預期可靠收穫·改良品質·預防病害...
「施葉養元」是與肥料·農藥為農家不可缺少的必需品。



不靠天·只靠「施葉養元」年年必豐收「施葉養元」的效能

1. 防止萎黃病·腐心病·萎縮病
2. 特別對於稻熱病有抵抗力
3. 加強病蟲害及倒伏之抵抗力
4. 促進植物生長及發育提高品質
5. 使用本劑可獲增收二成至六成

日本 株式會社シオヤゲン本舖出品

說明書備索即寄

臺灣總代理 英達貿易有限公司

臺北市華陰街49號 電話 46980


最新強力殺蒼蠅藥

特效 安全 經濟 衛生

滅蠅餅

蠅ナクソス

- 特點：
1. 蒼蠅一碰蠅餅立即死亡
 2. 滅蠅效力強大持久不變
 3. 每塊可繼續使用一個多月
 4. 用法簡單合乎衛生
 5. 白天滅蒼蠅，夜間殺蟑螂



日本 キング除蟲藥株式會社出品

各地藥房農藥行均售