

阿薩姆茶園增產的途徑

鐘 宣 邱

本文作者，在十一卷九期本刊上，曾經向各位說明怎樣栽培阿薩姆種茶樹的方法，如果你能切實按照該文經營阿薩姆茶園，並且注意下列的幾點，則成木茶園每公頃每年可採收四千五百至五千公斤的茶菁。

阿薩姆茶苗定植後，二年即可成園採收茶菁，成木茶園每公頃每年產量可達四千五百至五千公斤，但需注意下列的幾點：

適時摘心修剪

定植第一年的茶樹，既不能摘心又不可採摘。第二年春季，茶樹向上生長可達五十公分以上，生長漸見旺盛，應在夏秋季施行三至五次摘心，以促進側枝發生。冬季還應施行剪頂，在離地二十五公分處水平剪定，並將衰弱側枝及染有病蟲枝條剪去，在主幹上保留三至四枝健壯分枝即可。


但是切不可粗採濫摘。在冬季並施行第二次剪頂，在離地面三十公分處水平剪去，生長不健旺的枝條也應同時疏剪。中心生長旺盛的枝條，需行重剪，即在離地面二十公分處剪除，以抑制部分生長勢，促進其發展均勻。

第四年起每年冬季施行淺剪；即在前一年剪枝處提高四、五公分水平剪定，同時將虛弱側枝及受病蟲為害的枝節剪除，徒長枝條必須剪得更短。

農友們，請勿貪圖更多的秋茶而延遲剪枝，因為延遲剪枝，必將影響翌年春季的萌發。為了茶樹生長的健旺，應該適時舉行剪枝。

施行局部除草

阿薩姆種茶園，大部分佈於坡地，耕作管理方法，必須配合水土保持，始能減少表土沖蝕。幼木茶樹樹冠尚未開展，表土暴露，所以切勿完全除草，以局部除草法為宜，即除草的範圍，只限於茶樹主幹四周直徑〇.五



第一剪次與第二剪次



幼木茶園只宜局部除草

每年雨季後，必須巡視茶園階段及溝道有否損害。如有損害，必須及時修復。每逢雨後，必須注意茶樹週圍的積水情形，如有積水，應迅速即排去，因為幼木茶樹遭遇水浸過久，容易發生根腐病；輕則萎黃，重則枯死。

修整階段溝道

成木茶園的階段溝道修整工作，應與深耕同時舉行。

公尺的圓圈內，其他階段面、臺壁及溝道等，則只能用鐮刀將草刈短，如此地面因有雜草披覆，可減少土壤表面沖蝕。每年施行中耕除草約四至五次，雜草刈短工作則需增加數次。

平地成木茶園，每年施行全面中耕除草三次（三、五、九月各一次），但坡地成木茶園的臺壁及溝道等，則仍以用鐮刀刈短為妥。刈短次數應比中耕除草增加一至二次。



大生二十二

更改包裝啓事

大生二十二參磅美國

原裝新舊包裝式樣如左



舊包裝



新包裝

臺灣總代理

青象貿易有限公司

臺北市中正路一七五六號三樓
電話：二七四六
郵政劃儲臺灣第二一五六號
函索農藥說明書附郵票八角即寄