

來信請多
利用明信片，
信中免除客氣
話，寫明姓名
住址，信的正
面註明農問。

**防治梨樹赤星病
要砍除中間寄主**



本，係梨樹所受之病害。
請指示病名及防治法。
國姓鄉張樹木) (二) 奉
上藥品，請指示病名，發
生原因及防治法。(案中東勢張雙林) (三)
茲將病葉寄上，此病大部份發生在葉及葉
柄，全株都有發生甚烈。請指示防治方法。
(案中縣鄉玉田) (四) 本地梨樹，現時均
患此病，請指示防治法。(苗栗縣謝冷源)

【問】：(一)寄來標本，都是一梨樹赤星
病，其徹底防治辦法是砍除該病菌之中間寄
主「眞柏樹」(日名ビヤクシン學名Juniperus
Chinensis)。在該病菌之生活史一
定須要在「眞柏樹」上先行寄生，然後才能
寄生於梨樹上，故眞柏樹為其中間寄主。如
木縣果農大家協力砍除眞柏樹，該病即可絕
對根除，但要考慮眞柏樹及梨樹兩者之經濟
價值如何決定之。若眞柏比梨樹更有價值，
則不宜砍除。(二)撒佈藥劑是一種消極手
段，使用大生M.C.S四百倍撒佈，亦可部份
收效。(莊德榮)

**柑桔介殼蟲寄生菌
是益菌應妥為保護**

【問】：我種的柑桔現在發生紅丹色的介
殼蟲(附標本)，曾經噴馬拉松一〇〇〇倍溶
液不能殺死而繼續發生，可否用夏油噴霧或
其他何種藥劑始有效果？(屏東縣陳鳳起)

**防治黃守瓜爲害
最好用費文噴佈**

【問】：一、半磅的阿特靈四〇%可濕性
粉劑加水一五〇公升過於多嗎？二、上述藥
量加水灌注越瓜根旁爲何仍有黃守瓜爲害？
三、種種面積(越瓜)一·二五公畝，能以上
述藥量稀釋行株根灌注消毒嗎？四、一磅裝
的阿特靈分二次會過多嗎？(嘉義縣賴政勝)

【答】：(一)介殼蟲寄生菌(紅色圓形)是一
介殼蟲寄生菌，能寄生於介殼蟲體內使其
致死，是一種益菌，應妥為保護。介殼蟲寄
生菌撒佈殺蟲劑是不會殺死的，如撒佈殺菌
劑則會殺死的。(莊德榮)

【問】：一、半磅的阿特靈四〇%可濕性
粉劑加水一五〇公升過於多嗎？二、上述藥
量加水灌注越瓜根旁爲何仍有黃守瓜爲害？
三、種種面積(越瓜)一·二五公畝，能以上
述藥量稀釋行株根灌注消毒嗎？四、一磅裝
的阿特靈分二次會過多嗎？(嘉義縣賴政勝)

【答】：一、半磅阿特靈四十%可濕性粉
劑加水一百五十公升，已有六百六十倍。二
、因爲太淡所以無效。三、應加濃至二百至
四百倍試試看。四、一·二五公畝內用一磅
阿特靈分二次用，已會多。五、防治守瓜
最好用費文，加水五百倍噴佈。(陶家駒)

**果樹有果實或在花期
均不得噴佈夏油乳劑**

【問】：我在某農業研究之書籍上看到有
陶家駒先生所試驗「錫乃勃」(大生78)用
於柑桔上以防治象皮病，據云以八〇倍和
一七六〇倍噴之不知兩者何者爲優？又在落
花後多久才可噴霧？(二)柳橙留至成熟期
未及時收穫，延至春芽後才收穫，因此在成
熟期中春芽未出前，是否可噴霧夏油嗎？(三)
夏油在出芽後噴霧時所能影響的是那幾
部分？(彰化何村本)

請全省獸醫師養豬養雞業者注意！

豬、雞驅 阿司卡利肯
蟲藥之王

(內藥登字第一四六四號)


「適應症」豬、雞之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症
①效力強大—殺蟲之力試百分之九十五
以上。比任何種驅蟲藥超。成蟲、
蟲卵均死滅絕無副作用。
②用法簡單—投藥前不須絕食，服後不
須使用瀉藥洗腸。
③價格最廉—豬一頭一元，成雞一隻僅
五分代價可獲得數百倍利益。

日本東芝製藥株式會社榮譽出品



臺灣總代理 臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司
臺北市信義路二段一二〇號

大同電扇



各地農會
現依農貨
辦法優待
供應大同電扇請各
位先生多
多利用

大同電扇
創造利潤分至顧客，東西好又便
宜。服務最週到，設有十六處服
務站及巡迴服務隊到各地免費修
理

大同電扇
工廠最大，歷史最久，信用最好
，大同電扇保證品質安心使用，
要買電扇，請買最老牌最有信用
的大同電扇

五十年度
大同電扇
目錄及一
大同藥集
一月刊函
索即奉寄

大同製鋼機械股份有限公司
臺北市中山北路三段二十二號