

答：一、象皮病據筆者經驗所得，仍以極微粒水溶性硫黃粉為佳，撒佈倍數為二五〇倍，撒佈時間中部地區大約為七至八月間，有發病後發現時再行撒佈之。

二、有已成熟之果實在樹上或在花期及有幼果之際，均不得噴佈夏油乳劑，否則會引起落果。

三、夏油應在果樹休眠期間撒佈，出芽後可能影響抽芽及花芽之分化，故不可撒佈。又夏油之貯存期不可久貯，三週以上時夏油則逐漸分解。(莊德榮)

栽培木耳管理不好 能使初生木耳腐爛



購進木耳種菌，初生時發育很好，不多幾日，便有一、二日蠅蟻接踵而至，以後生之木耳全體皆然。請問1種植木耳之方法為何？2如何防止上述病害？3如何自製木耳種菌？(二)香菇：最近閱報載省農業試驗所之專家們研究利用化肥種植香菇有驚人成功。惟其中化肥名稱可能因排版漏列，例如×酸鈣六公斤。因此請問1應用那些化肥及如何種植？2日本香菇可以脫水乾製嗎，臺灣現在有無此種菌種，何處有售？應用如何方法使香菇脫水？(基隆林安祥)

【答】：(一)木耳：1請參閱豐年第十卷二十四期二十二頁「木耳可用人工栽培」。2木耳初出時發育很好，不多日死去，這一個原因可能是管理不善，如酒水不當，空氣污濁病蟲害發生，都能使初生木耳水化腐爛，噴撒2% BHC粉可驅除蟻蟻。3木耳、香菇種菌培養法，請參閱農復會編印「西洋菌培養法」種菌培養一節，內容是大同小異而成，唯瓶裝種菌培養材料為木屑與米糠混合而成，比例為木屑七分米糠三分。

(二)香菇：1炭酸鈣六公斤，2臺灣市民權四巷十八號施性忠經售香菇種及香菇脫水器。(胡開仁)

臺灣栽培咖啡區域 中南部等山地較宜



【問】：本省北部新店安坑地區，是否可能栽培咖啡嗎？栽培咖啡土質要如何？閱十一卷三期農業問答，所指阿拉伯種適合在本省栽培，其種子何處有售？(新店鎮曾一男)

【答】：本省北部新店雖然可以栽培亞拉伯種咖啡，如士林、臺北均有少數栽培，但因多季雨量太多氣溫亦嫌較低，不利於花芽形成與開放故產量較低。本省栽培區域，以中南部及花蓮以南臺東山地為優。其土壤性質，不過於苛求，但以富含有機質的肥沃壤土及火山岩土為最適宜，土層深而吸水力較強但排水優良，略帶黏性壤土亦宜，過於輕鬆之砂質土不適合於咖啡的生長。

咖啡種豆種苗，可向雲林縣經濟農場或嘉義農業試驗分所洽購。(朱慶國)

咖啡種苗在臺可購到 有機質壤土栽培較宜

【問】：高雄地區黏土是否適宜種植咖啡？多少年可以收穫？何時可以適宜種植，配何種肥料？何處可以買到種苗？(楠梓榮民醫院)

【答】：高雄市因海拔太低，且近於海岸線，夏天溫度太高，冬季太過於乾燥風力亦大，不宜於咖啡之栽培。咖啡適宜於海拔二〇〇—七〇〇公尺之山地。土壤以富含有機質之壤土為宜，黏重之土壤不宜於咖啡之栽培。定植後二—三年即可結果。三—五月下雨後均可種植。每株每年應施化學肥料(三要素比例二：一：四)〇·六一—五公斤，依植株大小而異。在雲林縣經濟農場與嘉義農業試驗分所可以買到種苗。(朱慶國)

梅樹未能開花 可用方法補救

【問】：一、敝人家裏有兩棵梅樹，接枝後已約近五年了，從來不開花不知何故，也

增收、早收之秘鍵



強根健穰劑

葉面撒布或肥料混合施用

“益農素”之效能

- 1. 促進植物生長ホルモンAuxin之生成
2. 增加細胞之酸化・還元酵素
3. 使作物之呼吸同化作用旺盛
4. 加速根部發育而肥料吸收快
5. 改良土壤之物理・化學的性質
6. 增強土壤中根瘤菌之氮固定作用

“益農素”之適用

稻麥、豆類、瓜類、蔬菜、果樹、菸、茶、棉、鳳梨、香蕉、洋菇、薄荷、木耳等各種農作物

- ◎樣品郵資八角備索 ◎現貨供應歡迎採用
◎徵求各鄉鎮經銷處，希望者函索細則

利農種苗行 彰化縣員林鎮中正路88號
信豐農藥行 郵局對面儲金中字第20760號
慶豐農友行 彰化縣永靖街永靖街2號
總經銷處 屏東潮州中山路54號

臺中太一農化研究社榮譽出品

武田老牌 最新農藥

武田滅菌錠劑

(武田メル) 稻素丸病 最新特效藥!

安特靈 19.5% 乳劑 (エンドリン乳劑)

武田マイシン ペスタン

飛佈達 2.5% 粉劑 20% 乳劑 (武田ヘプタ)

滅爾波爾多-18 (メルボルド-18)

日本武田藥品工業株式會社

農業總代理 立大貿易有限公司

臺北市太原路55號三樓 電話：48170