



不是品種之關係，因同一品種，鄰居的已結果實二年了。沒有病蟲害，非常茂盛，是什麼原因？二、我要將梅樹運種到他處，樹約一丈多一點，應該如何處理？(基隆廖泰盛)

【答】：一、來信所稱梅樹經嫁接後數年，均未開花，而生長則非常茂盛；不開花的原因，恐即因栽培地的土質過肥，氮素肥料含量過多，以致枝葉過份繁茂，有徒長而不開花的現象(即所謂生長非常茂盛)，可用下列方法，以謀補救。

1. 少用氮素肥料，多用過磷酸石灰及氯化鉀等磷素及鉀素肥料，以使枝葉發育充實而花芽分化良好。2. 將枝芽橫刻傷，在芽及枝的下方，約一公分處，刻一深達木質部的傷痕，使由上部下降的同化養份累積漸多，可使上方的芽變為花芽而開花。3. 可用環狀剝皮方法，將新梢或枝條的基部環切兩刀，而剝去其間的皮，寬約半分至一分，可使同化養份累積於上部，促進花芽的形成。

二、所稱一丈多高的梅樹，欲移植至他處，宜在其休眠期(十二月至二月)中挖掘，主幹四週，宜帶有大塊的原有土壤(主幹左右方帶原土各二尺，深二尺以上)宜以粗草繩繫於該土塊後，方可移植。(黃啓章)

文旦柚衰老不開花 應給與適當肥份等

【問】：約十八、九年的生文旦柚，已兩年全國不開花，是何原因？要如何整理才能使其再開花結實？(臺東縣林天素)

【答】：文旦柚已達十八、九年並且二年不開花，原因不一，如枝枯葉少，由於柚子本身生理衰老引起。惟就本省栽植文旦柚地區環境等而言，大凡栽植平地的可正缺開水結果，壽命至少維持二三十年。山地缺水，較平地壽命短，果樹如近衰老期應給與適當肥份，及注意防蟲防病。如生長過強可於早春利用枝上環狀剝皮或刻痕，和多季修剪，都有促進開花之效。又藉高接法可將老樹更新，促進生長勢力，恢復開花習性。(王兆全)

種植枳殼竹類等 可作柑桔園籬色

【問】：擬作柑桔園的籬色，請問有何種植物能獲有利生產兼可作籬色？何處可購種苗？(高雄縣吳耀亭)

【答】：柑桔園的籬色，而兼有生產作用的，有枳殼，其果實由國藥店收購為一種國藥用；其種子於播種後為砧木之用，乃金柑及温州蜜柑良好的砧木。砧殼的枝條上有多量硬刺，為良好的籬色，但所發生的病蟲害，與柑桔上發生的略同，故亦宜噴射藥劑，以免其傳播。

次為各種竹類，種植的位置，宜與柑桔栽培位置，距離二十五英尺以上，使不遮斷陽光。竹類亦有介殼蟲的寄生為害，故需防治，以免傳播為害。竹叢內側宜開深溝，使根群不伸至柑桔園之內。

再次為相思樹，宜植四、五行以形成林帶，亦宜注意防治介殼蟲的傳播為害。上述的種子或種苗，枳殼種苗可請新埔青果合作社介紹購買，竹類的種苗，可向各地農會詢問，相思樹的種子，可向各種子商店洽購。(黃啓章)

酸柑不宜製造果汁 可以製蜜餞或果醬

【問】：一、酸柑可否製造果汁，如檸檬一樣？二、請問果汁的製造法(最好檸檬汁製法)。三、酸柑結實不大原因何在？有何補救？(苗栗大湖吳瑞月)

【答】：一、酸柑主要採種供砧木用，果實因味淡極酸不宜作果汁，可改製蜜餞或果醬。二、普通壓搾鮮果汁方法，是先取全熟果↓洗滌↓去皮或帶皮↓壓搾用玻璃榨汁器或新白細布袋用手壓搾↓加適量糖水攪拌↓產品。至於工業大量製造果汁如檸檬汁，即取全熟果↓洗滌↓橫切二、三塊↓於特製壓搾機或電動攪拌機壓搾↓過濾↓加熱五至十分鐘↓殺菌↓過濾↓加糖適量↓裝瓶封蓋殺菌↓產品。三、酸柑果實因品種關係不能結大形果，除非另育新種。如果利用接木法可接植柑桶柑雪柑和甜橙。(王兆全)

檢驗合格登記證農藥字第 013 號



敝廠為擴大服務起見特聘請農業經驗豐富專門人員林能傑林丁旺先生負責解答有關農藥使用問題並可隨時應農友需求親臨實地指導
林丁旺先生：住彰化市介壽新村32號
林能傑先生：住臺中市中山路53號

大東化工廠 臺中市三民路一段九七七號 電話：4677

彰化連絡處：大農行 彰化市長順街4號

金魚牌

非洲魚粉

蛋白質 67%
50%
成份準確
歡迎賜顧

臺灣總經理：建福貿易股份有限公司

地址：臺北市信陽街23號

電話：25915, 25916