



# 熱天容易發生的幾種牛病

毅振



臺灣的氣候，一過了端午節，氣溫便一天比一天高。天氣熱，牧草或野草自然長得比較繁茂，耕牛也就易於採食過多飼料而引起消化器官的種種疾病。同時由於夏季日光強烈，日射病等也格外容易發生。現在把熱天容易發生的幾種牛病寫在下面，以供農友們參考。

## 急性胃鼓脹

給與過量發酵性飼料（花生藤、甘藷藤、未充分乾燥之乾草）或濃厚飼料時，容易引起胃鼓脹。主要症狀為食慾不振，反芻停止，胃部膨脹，舉動不安，呼吸困難，鬱背等。急症者極易因窒息而死亡。

治療法 輕症則用稻草按摩左側腹部。取稀鹽酸二十至三十立方公分（CC），溶在一啤酒瓶水中投與。如鼓脹嚴重，則宜速請獸醫施行穿腹手術，將胃內氣體排出。

## 第一胃食滯

症狀與鼓脹症不同，胃部不脹，手指感到堅硬，第一胃的機能減退，反芻失常，引起腹痛或呼吸困難等症狀。

治療法 用稻草摩擦腹部，取人工加爾魯斯泉鹽約三百公分，溶在三、六公升的水中投與。重症則應請獸醫施行胃部切開手術。

## 肺炎


忽然食慾不振，發高燒（四十一度左右），流灰白色鼻涕，初期則伴着咳嗽。呼吸急迫，反芻、泌乳都減少，尤其以小牛較為嚴重，死亡率很高，要特別注意病牛管理。常因氣候劇變，誤嚥藥物、飼料，或長期呼吸刺激性氣體而發生。

治療法 保持畜舍溫暖通風，病牛宜蓋毛毯保溫，充分墊鋪稻草。濕敷肺部，亦有效果。藥物則可注射強心劑或油性盤尼西林，但都要請獸醫施行。

## 熱射病

在夏季炎熱時，長時間曝曬太陽，或關在空氣不流通的悶熱畜舍中，都容易引起熱射病。病牛呼吸急迫，體溫上昇，脈搏微弱而多（約一百次），精神萎靡，不久即告暈倒。有時則流汗，陷入興奮狀態。

治療法 即刻移至樹蔭等陰涼的場所，讓病牛安靜，胸部及頭部並灑洒上冷水，給與充分水份，用大水桶一桶左右的水灌腸。要是尙不復原，則宜速請獸醫施行急救。



時天熱  
常帶風  
有來自火  
風水情無  
聽火知防  
災該應即

時來若旦一聽風  
注意火燈內層  
(心小)字細真要也火灶  
忌禁着該也煙(袖)食

注意着來未聽風  
理修定着也風門  
時吹到風大無若  
去吹風(給)手實(頂屋)掛厝