

原封農藥供應總匯

ORTHO → 美國好速牌...
安特靈(エンドリン)

CHEMPAR → 美國金霸牌...
巴松松(パラチオン)
水和硫黃劑 98.5%

Noury → 荷蘭農利牌...
富收多(ホスヒドール)
馬拉松(マラソン乳劑)

BAYER → 西德拜耳牌...
固殺松(コサチオン)
米賜多(メタシストツクスI)
多穗(ツーゼット)

大生 Z78
大生 M22(ダイセン)
美國羅門哈斯公司...

KDF → 西德開地化學公司...
馬拉松25%水和劑

土壤殺蟲劑
(ヘプタクロール 2.5% 粉劑)
日本日產化學公司...

Staley's → 美國賜德來植物油公司...
蛋白質瓜果蠅引誘餌(スターレ)

其他各國名廠出品各種農藥均有

直接進口商

東益貿易股份有限公司

臺北市天水路二號之四 電話：43802

中南部經銷處

建南農藥行

嘉義市中山路四五二 電話：2198



驅除乳牛寄生蟲

不可使用 DDT

陸增輝

牛舍或乳牛身上的蒼蠅，不過是這類誤用中的一個小例子吧。

農藥有許多途徑，會傳到牛乳裡去：有的是因為乳桶或盛乳的用具被噴了藥水，就拿來盛乳；有的是噴在牛身上被吸收了或是噴在飼料上被吃下去，然後傳到牛乳中去；有的是因為噴在牛舍的牆上或食槽中被牛吃下去，再分泌到牛乳中去。所以，對乳牛應用農藥，應該格外的小心！

最近，在我訪問農村時，發現有許多養乳牛的農友，用 DDT 來驅除牛舍或牛身上的蒼蠅。DDT 是家庭常用的一種殺蟲劑，一般人常用它來殺滅蚊蠅，所以酪農們用它來驅除牛舍或牛身上的蒼蠅，表面上看起來好像沒有什麼不妥，可是事實並不如此；因為 DDT 會被牛體吸收，積存在牛體中，或分泌到牛乳中去，對食用牛乳的人，發生不好的影響。

現在在市場上出售的農藥種類很多，新藥劑也不斷的在出現，這些農藥中，有的是根本不能在畜牧上應用的，如果誤用了，不但會毒死家畜，有時連人都會遭受中毒。如上面所說，用 DDT 驅除乳

重。為此，美國農部畜牧組最近還特地頒佈了關於農藥安全酪農們應該遵守的幾個基本法則，遵照該法則使用農藥或採取安全措施，則可避免意外的發生。這一基本法則的要點如下：
牛舍噴藥 牆壁或天花板上，宜用「大利農」或「馬拉松」；不宜使用 DDT、「靈丹」、「克

氣丹」，或其他的殺蟲藥劑。

牛身噴藥 宜用「除蟲菊精」加 Piperonyl butoxide；不宜使用 DDT、「靈丹」、「馬拉松」、「克氣丹」，以及其他類似的藥劑。

擠乳室噴藥 室外噴藥，請比照「牛舍噴藥」施行。室內噴藥宜比照「牛身噴藥」施行，但應避免噴及用具、乳罐、乳桶等。在室內並應避免使用「撒佈毒餌」。

角繩驅除 用 Methoxychlor 粉劑噴洒乳牛背部及頸部，每三星期一次。或用「馬拉松」粉劑亦可，但在擠乳前後五小時內嚴禁使用。

罐頭廠廢藥物的利用 除非你確知已無農藥剩餘成分存在，不宜用為乳牛飼料。

飼料衛生 注意收穫前的噴藥日期，不要使用近期內噴射過「阿特靈」、「克氣丹」、DDT、「地特靈」，或「安特靈」的作物或牧草做為乳牛的飼料。噴過「安特靈」後，需要經過四十五天以上，才能採收使用。