



農試所育成陸稻種  
每一可以兩期作



**[問]**：鄰人想栽培稻（在士林鎮旱田地帶），但有幾個問題請指示：一、在上述地區栽培二期作陸稻，應選何品種？二、那裡有種子出售？三、因該地帶以往均栽培蔬菜，地質肥沃。按過去栽培經驗到中後期，發育旺盛，以致不結穗，請問是何原因，有無辦法可以防治？  
**[答]**：（一）在士林鎮附近栽培陸稻，可種植本所（農試所）育成農旱一號（稻）或二號（梗），每年可以兩期作。每公頃平均收三千餘公斤。（二）種子可由農試所農藝系分送（贈與）。（三）蔬菜地氮肥過多，易生徒長現象而不結實。如栽培陸稻，勿再用富含氮肥之肥料（如人糞尿之類），補充磷、鉀、肥即可。（指過磷酸石灰及硫酸銅或草木灰）。磷鉀肥用量每十公頃過磷酸石灰二十公斤，硫酸鉀八公斤，係作基肥用。  
**（續進三）**

**[問]**：本地區種植陸稻，但此種陸稻之管理，以往各耕者尚缺乏常識，以致收穫很不及理想。對陸稻之播種及施肥、管理，何時為宜？  
**[答]**：（一）播種：以鋤頭或犁作成淺

陸稻在適宜地區栽培  
注意播種施肥等方法

農行距四十五公分。條播，播間二十公分，覆土約二至三分，播種量每公頃需種子六十公斤。發芽後過密者，應間拔之，如有缺株亦應補植，普遍發芽後三星期內分二次間拔，並將間拔之幼苗作補植之用。（二）施肥：多施用熟堆肥，每公頃一萬二千至一萬五千公斤。堆肥除供肥分外，另有增進土壤保水力防止旱害之效。至於化學肥料每公頃用硫鎳三百公斤，過磷酸石灰三百六十公斤，氯鉀九十公斤（化學肥料每公頃三分之二作爲基肥，留三分之一在發芽後二十至三十日內施用後即行培土四、五公分。（三）中耕除草培土：發芽後二星期內舉行第一次中耕除草，隔十天後再行第二次，此後視雜草發生多寡，繼續一至二次，最後一次並行培土。（石義明）

水稻秧苗過熟時插秧  
可能致早抽穗減產量

**[問]**：我有一畝稻田，一期作時常缺水，所以秧苗不能如期插秧。本年度一期作栽培蓬萊種（嘉南八號），因雨水的不足，播後五十天才插秧，是否過老？是否會影響收穫嗎？對本田後期管理有什麼方法改善嗎？  
**[答]**：（一）秧苗五十天是否過老？應以日照、溫度、施肥及有無疏播與品種不同而異，嘉南八號，普通在第一期作如超過四十五天已嫌過老。用老熟苗播秧有提早抽穗及不時抽穗之可能致減低收穫。因此在秧田

覆土約二至三分，播種量每公頃需種子六十公斤。發芽後過密者，應間拔之，如有缺株亦應補植，普遍發芽後三星期內分二次間拔，並將間拔之幼苗作補植之用。（二）施肥：多施用熟堆肥，每公頃一萬二千至一萬五千公斤。堆肥除供肥分外，另有增進土壤保水力防止旱害之效。至於化學肥料每公頃用硫鎳三百公斤，過磷酸石灰三百六十公斤，氯鉀九十公斤（化學肥料每公頃三分之二作爲基肥，留三分之一在發芽後二十至三十日內施用後即行培土四、五公分。（三）中耕除草培土：發芽後二星期內舉行第一次中耕除草，隔十天後再行第二次，此後視雜草發生多寡，繼續一至二次，最後一次並行培土。（石義明）

利用明信片，  
信中免除客氣，  
話，寫明姓名，  
住址，信的正面註明農問。


# 大肥喚

料飼助補質礦命他維合綜素生抗  
售均會農店料飼  
用請豬大養

卵產進促  
病疾防預  
所藥製源益

號二七二段三路福斯羅市北台

# 大同電扇



大同製鋼機械股份有限公司  
臺北市中山北路三段二十二號

五十年  
大同電扇  
目錄及一  
月刊函  
索即奉寄

大同電扇

工廠最大，歷史最久，信用最好，  
，大同電扇保證品質安心使用，  
要買電扇，請買最老牌最有信用，  
的大同電扇

大同電扇

各地農貨  
辦法優待  
供應大同電扇請各  
位先生多

創造利潤分享顧客，東西好又便  
宜，服務最周到，設有十六處服  
務站及巡迴服務隊到各地免費修  
理

香蘭將新種木田後，但無什麼好的改善方法。

(二)水稻較耐旱品種，蓬萊種為光復四〇一年，臺灣二號。在本種為烏龍酒後，自日本引來的(以上一開列)貴種。(二)製作。

### 蟲蟲為益蟲

#### 應注意保護

【問】：我對上標本，此蟲之名稱及特點如何？生活是細何？是益蟲或是益蟲？(臺中縣農大校)

【答】：所附標本為三種昆蟲，此等昆蟲均食害蟲為生，是一類益蟲，請加意保護之。年幼更易見生，腹黃色，幼蟲形，有光彩，堅立於有蚜蟲之枝葉上，一處十多粒食蚜蟲，經數次(二次)脫皮後，變為不食不動之蛹。再經數天，便脫皮為很漂亮之花姑娘，即台灣所寄來之標本。習性是以蚜蟲為生。偶食花粉我微微病隔孢子。(陶家駒)

### 李樹褐斑病為害

#### 可撤佈大生防治

【問】：一、四年生李樹，葉子顏色由淺黃而發紅以至枯乾，是否肥料不足或其他病害，有無救方法？二、三年生柑橘，遲遲不發新芽，葉葉略呈黃色，有將枯乾現象，種植地是新開墾山地，面南背山。是何原因，應如何挽救？三、三年生柑橘施用何種肥料最理想，如單用飼糞是否可以，還需加雜肥？(臺北榮繼德)

【答】：一、李樹標本是「褐斑病」為害，該病並非欠缺肥料而起，係由病菌之寄生，可以應用四百倍大生液撒佈防治。二、附來標本除於病及潛藏外，並無其他病害，致(可能沒有施肥)，柑橘施肥，氮、磷、鉀應作適當之配分。三、柑橘施肥請參考本刊七卷一期十二頁。(莊德榮)

磷酸鉀現有A B兩種  
磷酸鉀B須用作基肥

【問】：磷酸鉀的肥份如何？請詳闡示。(宜蘭縣農業局)

【答】：磷酸鉀有兩種：一種叫磷酸鉀A，含鉀1%，含磷24%，另一種叫磷酸鉀B，含鉀1%，含磷20%，含磷10%。



### 十石大豆可以葉面施肥 宜於播種二十天後施行

#### 十石大豆可以葉面施肥

【問】：一、乾燥地區種植三十五天左右的十石大豆，可否施行葉面施肥？二、十四公升之噴霧器要用多少肥料？每分地要噴幾桶？三、噴時有何注意事項？肥料是省產尿素。(臺南縣孫裕)

【答】：一、十石大豆為早熟品種，施行葉面施肥以播種後二十至三十天為宜，播種後三十五天，如尚未開花，也可以施用，不過效果不大。二、尿素葉面施肥，其濃度以三百倍以下為宜，如過濃則燒枯葉片，即一公升水需用尿素三、三公分，十四公升的噴霧器，要用尿素四六·一公分，每分地要噴四五至五桶。三、尿素溶於水中，然後噴於葉面，噴射時間以早上為宜。(劉文慶)

### 第十桃果實可以食用 可作果醬原料和飲料

#### 第十桃果實可以食用

【問】：本人於去年拜托貴社試驗，Bayer公司，請即回答。(高雄縣蔡榮雲)



好消息!!

雞白痢特效新藥出現了!!

英國卜內門公司榮譽出品

**Furella**  
TRADE MARK

‘福利來’

防治雞白痢

雞傷寒及其他家禽疾病特效新藥

治療用  
用法

預附用：配合飼料  
供飼餵



各地藥房、飼料行均售  
說明書函索即寄



Regd. Trade Mark  
of I.C.I. Ltd.

總代理：英商卜內門有限公司


臺北市中正路一八〇〇號 電話：二六六九〇

經銷處：永生西藥行

臺北市中山北路一段二四號 電話：四二四七六

富粒多(Folidol)：適用於水稻螟蟲及一般害蟲。  
殺蟲效能廣泛，可防治四百餘種害蟲。

中德貿易有限公司  
地址：臺北市懷愛路九十八號  
電話：三三一五七  
三三一五八  
三三一五九



葡萄及狗鴉酸。成熟及未熟果亦可供蔬菜用，適宜與咖哩共食。木材尚堅硬，可做建材等。（陸之琳）

### 李樹適於市場的品種

#### 有賣柑李大紅肉李等


【問】：一、據說任何種果樹在休眠期過後再移植栽培時，以後結果容易引起落花落果現象，是否正確？二、李樹品種有很多種，但在今日較適合市場銷路的有那幾種？又桃砧接李穗，這種李樹的性質與結果如何？

在李的品種中以那一種為早生？桃接李，適宜何種土質生長？三、在三十度左右的坡地栽植李樹，其株距應若何？（苗栗縣邱光慶）

【答】：（一）果樹在其休眠期過後，若行移植，則當年容易落花落果。因休眠期過後，樹液流動活躍，開始萌發新芽，該時若行移植，則根部受傷後，生長尚未恢復，故其吸收養份及水份的能力銳減，一時無法供應開花及結果時所需的營養份，故易落花落果。（二）李的品種適於市場用的，在臺灣有黃柑李（有大粒及小粒二種，以大粒的為佳）成熟時果皮及果肉，均呈黃色，味甜而濃，為良好品種，但其貯藏較弱，為其缺點。在貴林有大紅肉李，熟時果皮為紫紅色，果肉為深紅色，甜味較次於黃柑李，但甚為豐產。員林尚有臘脂李，果圓大，熟時果皮為臘脂色，果肉為淡紅黃色，味甚甜，但其產量低，為其缺點。在新竹有花燭李（分軟枝及硬枝二種，軟枝的果實大）熟時果皮呈淡紅色，果肉為淡紅色。在宜蘭有軟枝紅肉李，熟時果皮為淡紅色，果肉為紅色，味甜而豐產。（三）砧木為本地毛桃，接穗為良品種的李，則他的生長及結果情形，均甚良好，適宜的栽培土壤為肥力中等而排水良好的砂質壤土或礫質壤土。（四）李的早生品種，有新增的硬莖李及宮蘭的珍珠李，可於四月間上市，但果實均小，為其缺點。（五）在三十度左右的坡地栽培，坡度據其過大，株距宜為十五英尺。（黃啓章）

### 利用山地自有土地

【問】：一、現本省有否辦移民山地農荒



將由各農會供應推廣

仔鵝孵出後兩星期內

應給與營養豐富飼料

【問】：我的鵝仔產生了九隻（孵九個蛋），但其中已死了三隻，發病仔鵝

頭灑下落地，全身振動哀

呼不絕，然後全身變成很

軟如死體，已請教多位獸

醫均無法可治，到底是

二、若有。移民辦法為何？地區在何處？

三、有否補助或獎勵

政策？（臺南縣蔣金山）

【答】：一、本省平地農田面積有限，故鼓勵民間投資開發山地資源，為政府既定政策。經擬定有關山地開發工作推進方案及開發計劃等多項。

二、惟在目前調查區分宜農宜牧土地，以及查明土地權屬等工作未完成前，還沒有你所謂「移民」辦法，故租或放領土地與平地人民，使移住山地。

三、如在山地已自備有土地，而要利用以興辦農場或牧場者，農復會當可考慮予以技術協助，如係辦牧場而買牛資金有困難時，可向土地銀行申請貸款。（邱炳華）

### 豬的驅蟲藥比配拉淨

卷六期第八頁會報導毛


猪驅蟲改用新藥「比配拉淨」。我會輕到農會及藥房購買，多說沒有此藥，未知何處推銷或

此藥，未知何處推銷或

公司：臺北市中正路1791號二樓  
電話：31691  
工廠：北基公路七堵草溝站旁  
電話：七堵35號

五 蜂商標

五豐化學工業股份有限公司  
與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製



現貨應市

①臺北市延化街	臺灣農產企業公司	電話：44253	⑪雲林斗六鎮南昌甲新興街30號永豐農資材行 電話174
②桃園縣中正路103號	(大廟後)農友公司	電話：743	⑫嘉義縣義竹鄉六桂村199號
③新竹市中華路226號	青果合作社	電話：25	⑬臺南市東門路140號
④新竹市中華路184號	新竹農產公司	電話：938	⑭高雄縣鳳山鎮第二市場內
⑤苗栗後龍中正路55號	源和西藥公司	電話：6	⑮高雄縣大同鄉儀脚村42號
⑥臺中市三民路1段175號	信全農藥公司	電話：3343	⑯高雄縣美濃鎮合和里11號
⑦員林中山路229號	泰隆發建材公司	電話：184	⑰屏東萬丹鄉萬安村69號
⑧南投草屯中山街		電話：155	⑱高雄路竹鄉竹西村70號
⑨雲林縣北港民主路56號			⑲豐安農業公司

經銷處

虎尾鎮劉慶斌  
摩病？未知有無妥善預防或是根治妙法？（一）

去數隻，這很可能是得不到食物的營養而致餓死。

仔鵝開頭兩個星期應給與比較營養豐富的精料。精料的配合如豆餅粉、麥麩及碎米各一份的混合。每日早晚飼與兩次即可，其餘時間可給與幼嫩青菜或青草，任其啄食。兩星期至三星期後即不補充精料也沒有關係。照這樣飼養仔鵝就不會夭亡了。（李登元）

## 本刊讀者請注意

今年七月十五日為本刊創刊十週年紀念，本刊為明瞭訂戶保存「豐年」情形，特舉辦登記。凡自本刊創刊以來至本期為止，保存所有各期「豐年」，而無任何一期短缺者，請於今年七月五日以前來信本社登記（信件上註明「總務」二字），本社將酌送紀念獎品。

以上各類農友來信，已轉寄專家答覆。  
請候本社覆信。  
  
周瑞傳 周東啓 劉東啓 官德芳 吳如祥 吕慶森  
洪東榮 陳積輝 林登源 李信男  
陳澄濱 姚本源 鄭朝坤 郭完田  
歐大松 許新民 曾朝鑑 黃水河  
葉佳標 王土玉 彭阿輝

\*

\*

\*

◎勝過任何種植物促進劑、保證效力

## 現貨供應

植物生育促進劑，**2571**

◎全省各地農藥行、種子行均有出售



信承農產行

彰化縣溪湖鎮平和里員鹿路六六號二 TEL 122

利農種苗行

員林鎮中正路88號 郵局劃撥儲金中字第20760號

各省全告收地獸醫師

的牌老最本日的久很待期們您

シミカイロオホ

用請者效無用使素生抗  
**福**  
：元達製

所究研學料理本日

劑活胞細性毒病抗

劑素色光感：份成

效特

病似類及痘瘡1

症血敗或疫肺性瘧傳2

症熱明不3

病JVH.4

病寒傷副瘧5

人的適用使用請者用使未

◎處銷經地各求徵◎


：銷經總臺灣。

（素備獻文）七之二七路水影里竹大鎮湖溪縣化彩行臺惠

新台幣1元~3元

禽聖片

A.C.M



養鷄專家

如 果 禽 家 禽 片 片 片 片  
來 病 算 生 有 可 好 便 簡  
已 發 發 有 效 靠 用 宜 單  
最 最 最 最 最 最 最 最

——最高抗生素 + 3種礦銨劑——

衛試藥字第2390號

藥房・飼料行・農會均售



太平洋製藥廠

臺北市中山北路1段105巷90號