

否則將老苗插秧未田後，似無什麼好的改善方法。

(一) 水澆較耐旱品種，莖葉應為青灰明，(二) 莖葉應為青灰明，(三) 莖葉應為青灰明，(四) 莖葉應為青灰明，(五) 莖葉應為青灰明。

應注意保護

【問】：對上述標本，此標本名稱及將注如何？生活更如何？是否應或變為？(臺中縣農會)

李樹褐斑病為害

【問】：一、四年生李樹，葉子顏色由淺黃而發紅以至枯乾，是否肥料不足或其他病害，有無挽救方法？二、三年生柑桔，遲遲不發新芽，葉略呈黃色，用有將枯乾現象，種植地是新開墾山地，而南背山。是何原因，應如何挽救？三、三年生柑桔施用何種肥料最理想，如單用糞葉是否可以，還需加雜其他肥料否？每株每年施量如何，分幾次施肥？(臺北榮總)

可撒佈大生防治

【問】：一、李樹標本是一「褐斑病」為害，該病並非欠缺肥料而起，係由病菌之寄生，可以應用四百倍大生液撒佈防治。二、附來標本除於病病及潛蟻外，並無其他病害，炭疽病乃生長不良時引起，潛蟻僅一片葉被害，可能是貴園陽光照射不足，施肥不當所致(可能沒有施肥)，柑桔施肥，氮、磷、鉀應作適當之配合。三、柑桔施肥請參考本刊七卷一期十二頁。(莊德榮)

磷酸鉀B須用作基肥



【問】：磷酸鉀的肥份如何？請速賜示。(宜蘭縣農會) 【答】：磷酸鉀有兩種：一種叫磷酸鉀A，含氮二二%，含磷四八%。另一種叫磷酸鉀B，含氮二〇%，含磷四八%。本省常用的磷酸鉀B，粒狀，灰色或黃褐色，可溶於水，不可與鹼性物質混雜，須用作基肥。(李孫甫)

十石大豆可以葉面施肥

【問】：一、乾燥地種植三十五天左右，可否施行葉面施肥？二、十四公升之噴霧器要用多少肥料？每分地要噴幾桶？三、噴時有何注意事項？肥料是省產尿素。(臺南縣孫裕)

【答】：一、十石大豆為早熟品種，施行葉面施肥以播種後二十至三十天為宜，播種後三十五天，如尚未開花，也可以施用，不過效果不大。二、尿素葉面施肥，其濃度以三百倍以下為宜，如過濃則燒枯葉片，即一公升水需用尿素三·三公分，十四公升的噴霧器，要用尿素四六·二公分，每分地要噴四至五桶。三、尿素溶於水中，然後噴於葉面，噴射時間以早上為宜。(劉文慶)


第倫桃果實可以食用



【問】：本人於去年拜托貴社試驗ビワモドキ的用途，已經寄上，請即回答。(高雄縣蔡煥雲) 【答】：第倫桃，口名ビワモドキ。果實可食用，食用部分即為肥厚之瓣片部分，肉質多，汁液酸，具有類似未成熟蘋果果芳香氣，可作果醬原料，亦可作清涼飲料。營養價值極少，果中含有少量單寧、葡

富粒多 (Folidol)：適用於水稻螟蟲及一般害蟲。

殺蟲效能廣泛，可防治四百餘種害蟲。



中德貿易有限公司

地址：臺北市博愛路九十八號
電話：三三一五七
三三一五八
三三一五九



好消息!!

雞白痢特效新藥出現了!!

英國卜內門公司榮譽出品



‘福利來’

防治雞白痢

雞白痢及其他家畜疾病特效新藥



用法：配合飼料
治療用：一二倍
預附用：配合飼料
供飼銀：四四八倍



總代理：英商卜內門有限公司
臺北市中正路一八〇〇號 電話：二六六九〇
經銷處：永生西藥行
臺北市中山北路一段二四號 電話：四二四七六