

否則將使苗期木用後，似無什麼好的改善方法。

【問】：水澆較耐旱品種，莖葉應為青復，白，或淡白。在來種為烏黑油，白，或淡白。以上一則在（白粒）一則在（白粒）。

應注意保護

【問】：本對本標本，此標之名稱及特注如何？生苗如何？是標或否標？（中標或否標）

【答】：本對本標本，此標之名稱及特注，均食此標為生，是一類益蟲，請加意保護之。年活更見卵生，卵黃色，幼蟲形，有光彩，豎立於有粉蟲之枝葉上，一處十多粒，孵化後為藍色有紅色斑及有刺之幼蟲，捕食粉蟲，經數次（二次）脫皮後，變為不食不動之蛹。再經數天，便脫皮為很漂亮之花姑娘，即台端所寄來之標本。習性是以粉蟲為生。偶食花粉我粉微病菌孢子。（陶家駒）

李樹褐斑病為害

可撒佈大生防治

【問】：一、四年生李樹，葉子顏色由淺黃而發紅以至枯乾，是否肥料不足或其他病害，有無挽救方法？二、三年生柑桔，遲遲不發新芽，葉略呈黃色用有枯乾現象，種種地是新開墾山地，而南背山。是何原因，應如何挽救？三、三年生柑桔施用何種肥料最理想，如用用糞是否可以，還需加雜其他肥料否？每株每年施量如何，分幾次施肥？（臺北榮德號）

【答】：一、李樹標本是「褐斑病」為害，該病並非欠缺肥料而起，係由病菌之寄生，可以應用四百倍大生液撒佈防治。二、附來標本除於病及潛蟎外，並無其他病害，炭疽病乃生長不良時引起，潛蟎僅一片葉被害，可能是貴園陽光照射不足，施肥不當所致（可能沒有施肥），柑桔施肥，氮、磷、鉀應作適當之配合。三、柑桔施肥請參考本刊七卷一期十二頁。（莊德榮）

**磷酸鉀現有A B兩種
磷酸鉀B須用作基肥**



【問】：磷酸鉀的肥份如何？請速賜示。（宜蘭縣溫福壽）

【答】：磷酸鉀有兩種：一種叫磷酸鉀A，含氮一%，含磷四八%。另一種叫磷酸鉀B，含氮二%，含磷四八%。本省常用的磷酸鉀B，粒狀，灰色或黃褐色，可溶於水，不可與鹼性物質混雜，須用作基肥。（李瑞清）

**十石大豆可以葉面施肥
宜於播種二十天後施行**

【問】：一、乾燥地隔種三十五天左右十石大豆，可否施行葉面施肥？二、十四公升之噴霧器要用多少肥料？每分地要噴幾桶？三、噴時有何注意事項？肥料是省產尿素。（臺南縣孫松）

【答】：一、十石大豆為早熟品種，施行葉面施肥以播種後二十至三十天為宜，播種後三十五天，如尚未開花，也可以施用，不過效果不大。二、尿素葉面施肥，其濃度以三百倍以下為宜，如過濃則燒枯葉片，即一公升水需用尿素三、三公分，十四公升的噴霧器，要用尿素四六、二公分，每分地要噴四至五桶。三、尿素溶於水中，然後噴於葉面，噴射時間以早上為宜。（劉文慶）

**第倫桃果實可以食用
可作果醬原料和飲料**



【問】：本人於去年拜托貴社試驗ビワモドキ用途，已經寄上，請即回答。（高雄縣蔡煥雲）

【答】：第倫桃，口名ビワモドキ。果實可食用，食用部分即為肥厚之瓣片部分，肉質多汁帶酸，具有類似未成熟蘋果果芳香氣，可作果醬原料，亦可作清涼飲料。營養價值極少，果中含有少量單寧、葡萄糖。

**好消息!!
雞白痢特效新藥出現了!!**

英國卜內門公司榮譽出品



‘福利來’

防治雞白痢

雞白痢及其他家畜疾病特效新藥



用法
治療用：配合飼料
預附用：配合飼料
供飼餵：四四八倍



總代理：英商卜內門有限公司
臺北市中正路一八〇〇號 電話：二六六九〇
經銷處：永生西藥行
臺北市中山北路一段二四號 電話：四二四七六



富粒多 (Folidol)：適用於水稻螟蟲及一般害蟲。
殺蟲效能廣泛，可防治四百餘種害蟲。

中德貿易有限公司

地址：臺北市博愛路九十八號
電話：三三一五七
三三一五八
三三一五九