

# 預防豬瘟的確實方法



劉 煊 炎

豬瘟是很可怕的一種病毒，傳染力很强，死亡率又高達百分之九十五以上，近年來，由於防治工作的普遍推行，發病率已顯著地減少，可是並沒有達到絕跡的階段，希望農友們多加提防！

臺灣的養豬頭數，在光復當初，只有四十餘萬頭，就是日據時代的最高養豬頭數，也祇有一百八十萬頭，但是根據民國四十九年的統計，本省養豬頭數，已經達到三百五十萬頭之多。

爲什麼臺灣的養豬頭數會增加到將近二倍之多呢？這主要原因之一，就是因爲豬瘟防治做得好，因患豬瘟死亡的豬隻減少了的緣故。但是，豬瘟在本省，仍然沒有達到絕跡的階段。

## 撲殺病豬

各位農友都知道，豬瘟是一種豬的傳染病，牠的病源，我們用普通的顯微鏡還無法看到，我們通常叫它做濾過性病毒（豬瘟病毒）。這病毒如侵入豬的體內，經過三至十日，豬隻無論大小都會發病。有下述病狀時，應該趕快請獸醫師診斷：發燒（四十四至四十一度上下）

，食慾減退，元氣消沉，便秘，有時眼睛發紅，泌出粘膿性分泌物。到後期則食慾全廢，下痢，皮膚出現紫紅色血斑，伏臥在豬舍暗角以致死亡。

感染此病的豬，百分之九十五以上（百分之百）都會死亡；急性的在三至五日內斃死，慢性的經過一、二星期或更長期間斃死。慢性的又往往併發肺炎或腸炎，同時隨眼淚、糞尿、血液、唾液等排泄病毒，傳染給健康的豬。尤因病豬應在極早期治療，而一般發現病症時，多已超過有效治療期，所以病豬不宜治療，應該早些撲殺燒燬或深埋，其他還沒有發病的豬，則應趕快請獸醫使用豬瘟血清做緊急預防注射才好。

## 注射疫苗

如上面所說，豬瘟在發病後大多是無法治療的，所以，最好是在事前預防，避免發病。注意豬舍環境衛生（尤其是嚴密消毒發生過豬瘟的豬舍、用具）固然是必要的工作，但是最爲重要的，還是預防注射。各位都很清楚，農林廳淡水獸疫血清製造所出品的兔化豬瘟乾燥疫苗，是預防豬瘟的最有效武器，根據試驗報告，小豬出生後四星期就可以注射，且在此時注射，比六星期以上或在中豬時注射要安全。


預防注射後免疫有效期間可以達到十個月以上，也就是說，預防注射了以後，十個月以上不會感染到豬瘟，所以，最好在出生四星期時就向當地鄉鎮公所或農會申請預防注射。

## 注意耳號

本省的小豬，通常在出生二個月後出售，此時已過預防注射的適期，所以，如果自己不要養母豬，需要向外購買仔豬時，就應注意選購已經預防注射過的小豬。

各位都知道，預防注射過的小豬，耳朵都有剪號，但是要小心，有些投機豬販，他們買

# 游泳雖是好運動 着要小小正適當



，奇好(較)卡成生(于孩小)仔因  
，味趣有水玩對(部)擺  
，止阻強臂成可不  
。(于孩小)伊勤來嘴好該應



，動運好是雖泳游  
，當通(才)正心小要着  
，王羅問兒去(心小不知)無那  
。枉完真牲猴白白




，中假暑節時天夏  
，泳游去愛都人人  
，動運好在實泳游  
。奧清(又)聞身健潔清

綠竹文  
小龍圖

進沒有注射過的小豬，自己偷剪耳號，當做注射過的小豬出售，所以，買小豬時，不單要看耳架的剪號，同時還要向豬販或養母豬的農友索取注射收費的收據，如有最近日期的收據，那麼就安全可靠了。

### 拒購私宰豬肉

最後要向各位提醒的一點，就是不購買私宰的豬肉。私宰的豬，往往是病豬，為貪一點小便宜而購買私宰豬肉，容易把病源帶進豬舍，招來很大的損失。正式屠宰的豬，都事前經過健康檢查，屠宰剖解後又作屠體解剖檢查，經獸醫師認為沒有病症的才准出售，購買這樣的豬肉食用，才不會發生上述的危險。



## 影響肉豬外觀的脫腸病

趙法清

脫腸（赫尼亞，ヘルニア）是常見的一種仔猪疾病，病猪雖然不至死亡，但外觀頗為奇異，農友們養猪，應該注意選擇與日常管理，以避免該病的發生。

仔猪「赫尼亞」，通常可分為「鼠蹊赫尼亞」、「陰囊赫尼亞」、「臍赫尼亞」，與「腹壁赫尼亞」四種，但以前三種較多，「腹壁赫尼亞」發生較少。發生「赫尼亞」的仔猪，體質發育多很好，經過適當的治療，都可使它痊癒恢復正常。現在將此病病因、病狀，以及防治方法敘述於下，以供農友們的參考。

### 先天後天，均可致病

「鼠蹊赫尼亞」及「陰囊赫尼亞」的發生，主因先天性的遺傳，或後天性的腹內壓增加所致，而後天性腹內壓的增加，多因捕捉仔猪，或仔猪相互騷擾，鬭爭而引起，所以，此二種「赫尼亞」，多發生於哺乳時前半期中，且以雄性仔猪發生較多。

「臍赫尼亞」的發生，先天性的主因臍輪異常擴大，後天性的則因臍帶切斷時，臍帶強引或腹內壓增加而引起，所以，後天性的，多在出生後發生，且以雌性仔猪發生較多。

### 陰囊膨大，臍輪腫脹


發生「鼠蹊赫尼亞」及「陰囊赫尼亞」的公猪，常見鼠蹊部或陰囊的一側，或兩側膨大。先天性者並沒有顯明的障礙。

「臍赫尼亞」發生在腹壁臍輪部位，可以看到大小不定的圓球囊，內容物為一部份小腸或網膜脫出，用手壓迫可消退，用指探索臍輪及鼠蹊口，則可觸到硬固的輪環。

### 淘汰劣猪，注意管理

預防仔猪赫尼亞發生，除淘汰種猪，去除先天性遺傳因子之外，還應設法避免鬭傷，以及仔猪相互騷擾等後天性的發病原因，同時在哺乳期間捕捉仔猪，也應避免用力。切斷臍帶時，也應加倍小心。

「赫尼亞」治療最徹底而完全的方法，為施行手術。發病時，應請有經驗的獸醫施行手術。施行手術後一週內，應給與有營養的液狀食物，並禁止運動，注意清潔。



，去人大(同)中能好最  
，(去己自意故)治加格通換萬十  
，去(列不)味咱流(急)離水深  
。己自換險冒通噠



，冰游(要不)味後飯前飯  
，前水落動運備預  
，淘去即好寒(祭耳)耳雙  
。(睛眼)周日點藥目復酒



，噱叮(又)聞句一後最  
，(皮頑)搥手莫時(之)挨冰游  
，經正着冰游(要)卜想  
。情無是火水講人