

進沒有注射過的小豬，自己偷剪耳號，當做注射過的小豬出售，所以，買小豬時，不單要看耳架的剪號，同時還要向豬販或養母豬的農友索取注射收費的收據，如有最近日期的收據，那麼就安全可靠了。

拒購私宰豬肉

最後要向各位提醒的一點，就是不購買私宰的豬肉。私宰的豬，往往是病豬，為貪一點小便宜而購買私宰豬肉，容易把病源帶進豬舍，招來很大的損失。正式屠宰的豬，都事前經過健康檢查，屠宰剖解後又作屠體解剖檢查，經獸醫師認為沒有病症的才准出售，購買這樣的豬肉食用，才不會發生上述的危險。



影響肉豬外觀的脫腸病

趙法清

脫腸（赫尼亞，ヘルニア）是常見的一種仔猪疾病，病猪雖然不至死亡，但外觀頗為奇異，農友們養猪，應該注意選擇與日常管理，以避免該病的發生。

仔猪「赫尼亞」，通常可分為「鼠蹊赫尼亞」、「陰囊赫尼亞」、「臍赫尼亞」，與「腹壁赫尼亞」四種，但以前三種較多，「腹壁赫尼亞」發生較少。發生「赫尼亞」的仔猪，體質發育多很好，經過適當的治療，都可使它痊癒恢復正常。現在將此病病因、病狀，以及防治方法敘述於下，以供農友們的參考。

先天後天，均可致病

「鼠蹊赫尼亞」及「陰囊赫尼亞」的發生，主因先天性的遺傳，或後天性的腹內壓增加所致，而後天性腹內壓的增加，多因捕捉仔猪，或仔猪相互騷擾，鬭爭而引起，所以，此二種「赫尼亞」，多發生於哺乳時前半期中，且以雄性仔猪發生較多。

「臍赫尼亞」的發生，先天性的主因臍輪異常擴大，後天性的則因臍帶切斷時，臍帶強引或腹內壓增加而引起，所以，後天性的，多在出生後發生，且以雌性仔猪發生較多。

陰囊膨大，臍輪腫脹


發生「鼠蹊赫尼亞」及「陰囊赫尼亞」的公猪，常見鼠蹊部或陰囊的一側，或兩側膨大。先天性者並沒有顯明的障礙。

「臍赫尼亞」發生在腹壁臍輪部位，可以看到大小不定的圓球囊，內容物為一部份小腸或網膜脫出，用手壓迫可消退，用指探索臍輪及鼠蹊口，則可觸到硬固的輪環。

淘汰劣猪，注意管理

預防仔猪赫尼亞發生，除淘汰種猪，去除先天性遺傳因子之外，還應設法避免鬭傷，以及仔猪相互騷擾等後天性的發病原因，同時在哺乳期間捕捉仔猪，也應避免用力。切斷臍帶時，也應加倍小心。

「赫尼亞」治療最徹底而完全的方法，為施行手術。發病時，應請有經驗的獸醫施行手術。施行手術後一週內，應給與有營養的液狀食物，並禁止運動，注意清潔。



，去人大(同)中能好最
，(去己自意故)治加格通換萬十
，去(列不)味咆流(急)離水深
。己自換險冒通噠



，冰游(要不)味後飯前飯
，前水落動運備預
，洩去即好寒(祭耳)耳雙
。(睛眼)周日點藥目復洩



，噱叮(又)聞句一後最
，(皮頑)搥手莫時(之)挨冰游
，經正着冰游(要)卜想
。情無是火水講人