

為害多種蔬菜的茄綿疫病

吳福壽

綿疫病主要侵害茄果，但是番茄、馬鈴薯、胡瓜、南瓜等也會發生，請菜農們注意預防，尤以夏季豪雨持續時為最緊要。

綿疫病是一種侵害茄果的病害，此病發生，可使果實腐爛，影響產量及採種至鉅，夏季豪雨連續時，宜多加注意預防，以免損失。

夏季兩期發病多

綿疫病多發生在夏季兩期。本省北部從六月開始至八月，隨時都可發生，尤其在七月最盛。此病主要侵害茄、番茄、馬鈴薯、胡瓜、南瓜等亦可發生。

此病病原菌發育適當溫度為攝氏三十度。病原菌卵孢子在土壤中生存越冬，至次年再由此傳染蔓延。

果實腐爛生白霉

此病主要侵害果實，有時苗上亦可發生。起初果實上

爛。外觀健全的果實，在運輸中也可能發病。

防治方法有五種

茄綿疫病的防治法共有下列五種：

- (一) 發病地應行輪作。
- (二) 選定排水通風佳良的土地栽植。
- (三) 避免單用氮質肥料，並充分施用鉀質肥料。
- (四) 迅速清除墊草及病果，集中燒燬。
- (五) 夏季豪雨連續時，撒佈四一三式或六一三式「少量石灰波爾多液」數次，至收穫前十天為止。



果病病疫綿茄

地下殺蟲劑



沒用了!!
飛佈達
井的耕作
辛苦都
完了



美國威力克化學公司出品

臺灣獨家加工廠 中華山本農藥有限公司
臺灣總代理商 大安行股份有限公司

函索飛佈達粉劑使用說明書附郵票四角即寄

好消息!! 雞白痢特效新藥出現了!!

英商卜內門公司榮譽出品



‘福利來’

防治雞白痢

雞白痢及其他禽畜疾病特效新藥

用法
治療用：配合飼料
一—二倍
預防用：配合飼料
四—八倍
供飼銀



總代理：英商卜內門有限公司
臺北市中正路一八〇〇號 電話：二六六九〇
經銷處：永生西藥行
臺北市中山北路一段一二四號 電話：四二四七六

秋作花生

應該早播!

秋作花生，初期雨水多，氣溫高，到後期則雨水少，氣溫漸降。為避免花生生育後期遭受低溫亢旱影響，應該儘量早播。在花蓮、宜蘭、臺北、桃園、新竹、苗栗等中北部栽培秋作花生，應該在七月中旬左右播種；如在中南部地區，因為十月以後開始旱季，應該在七月初、中旬播種，以免在生育中後期遇到亢旱。

關於秋作花生栽培應注意的事項，下期本刊將另刊專文報導 (林興)