



乳羊擠奶時間

最好一天二次

【問】：我養有奶

羊三十多頭，因羊奶銷路不大好，故每日在早晨祇擠奶一次，已足够用。請指教擠奶的次數。(新竹市許同榮)

【答】：乳羊擠奶最好一天擠二次；一次在上午，一次在下午，時間一定要固定。根據報告，二次擠奶會比一次多，如果奶量太少一定要節省人工，可以由自己酌定。成了習慣之後不至有妨礙母羊的健康。(林誠華)

花豆種植分春秋二期

砂礫土壤須多施堆肥

【問】：一、我所耕作的畑有二分餘地都是石質在想栽種花豆(日名ウズラ豆)是否適合嗎？

二、未知每分地收量有多少？不知用什麼肥料？用不知什麼時期栽種最合，宜指教。(宜蘭礁溪林秋明)

【答】：一、貴地之石質土壤係頁岩砂礫土壤，乾濕不平衡，若想種花豆必須多施堆肥，方可獲得良好的收成。

二、花豆之種植期春季三月一四月上旬

選購優良種子苗木或農藥請向

誠實可靠信用最好的利農種苗行

黑葉極早生包心白 金葉極早生包心白 極早生金寶高麗菜
鳳山極早生花椰菜 特選黃金白菜 特選入十大油菜
馬耳四十八早菜頭 白花格林菜子 扁甲刈菜
黃心芥菜 清江白菜 二尺半長菜豆
美國加州大甜椒 利農節成刺瓜 黃花格林菜子
其他蔬菜種子苗木或農藥等均備價格表函索即寄

利農種苗行

本行員林鎮中正路88號 電話呼出一七八號
分行永靖鄉中山路56號 郵政收換中字二〇七六〇號

，秋季八月下旬一九月，因為其時溫度為發芽適溫，花豆發芽開花後，其時之溫度恰好為花粉發芽適溫(攝氏二〇—二五度)故在北部，有春秋兩季之播種適期。

三、每分地之肥料，除堆肥(約一、〇〇〇公斤)或土糞外，需施三五公斤之過磷酸鈣及七二公斤之木灰為宜。在本葉二三枚施一次追肥即稀釋人糞尿或尿素稀釋液(約尿素六公斤與水一五擔)一五擔促進初期生育。

四、為了提高產量，宜採用條播，株距約一〇—一二公分，行距約三〇—三五公分就可，每一〇公畝產量由土壤之肥瘠而定，最差六〇公斤(乾燥種子)最好二四〇公斤左右。由貴地之地力判斷約一〇—一五〇公斤之產量就不錯了。(王進生)

王財福 李龍森 李永親 時澤臣
黃運來 廖克明 陳家拙 呂炳煒
張在受 陳錦城 杜雲卿 邱永瀾
蔡阿華 陳炎坤 賴梓 黃巨鋒
黃耀堂 李連聰 林義雄

以上各位農友來信，已轉請專家答覆，請候本社覆信。

武田老牌 最新農藥



武田滅爾錠乳劑

(武田メル) 稻熱病 最新特效藥！

安特靈 19.5% 乳劑

(エンドリン乳劑)

武田 マイシン
ペスタン

飛佈達 2.5% 粉劑

(武田ヘブタ)

滅爾波爾多-18
(メルボルド-18)

日本武田藥品工業株式會社

農藥總代理 立大貿易有限公司

臺北市太原路55號三樓 電話：48170

王大擊引 CLINTON ENGINE



擊引頓林克

世界最出名

●五大特點：①省油，②耐用，③有力，④啟動快，⑤零件齊全
●最合用：①リヤール，②抽水機，③脫穀機(機器桶)，④耕耙機，⑤運搬車
●各種馬力：3.3, 4.0, 6.3, 7.5, 9.6, 10.3
說明書目錄函索即奉寄

巨豐貿易有限公司

地址：臺北市昆明街19號
電話：三一〇二九四

敬告顧客

荔枝葉成熟期到了，現在採葉中，若有意種植荔枝者，請撥駕光臨參觀指教毋任歡迎，敝園定將以特價優待直接來本園訂購之顧客，酬謝賜顧。

林永旭荔枝苗園

臺中縣潭子鄉頭家厝中山路十號