

量產加增・穫收早提

新竹地區 糊仔甘 栽培新法

——明 樂 蕭——

新竹區農業改良場經過多年的試驗，證明採用一種改良法栽培糊仔甘，不但可以把握收穫期提早，同時還可以使產量增加一倍以上。

過去每年到了二、三月間，新竹地區的農友便須向中南部採購大量糊仔甘，做為飼食或家畜的飼料，價格往往比秋作甘高出一倍以上，對農


③砂質壤土（粘質地在工作上比較費勞力。）
選定稻種 選植早熟水稻品種，如「新竹五三號」。

正條密植，預留空行 採用正條密植法插秧，並自第三行起，每隔四行減插一行（留空行），將減插的秧苗，交互改插在兩邊稻秧間。（請看圖一）

築畦

水稻最後一次除草後，先在預留空行的一邊，踏入舊稻草或未熟堆肥。（請看圖二）

然後再用寬十分的小鋤頭，在另一邊掘成十分深的水溝，並將掘起的泥土



畦小築並溝小開：三圖

因栽培期間較短而且氣溫低，如果用在來甘諸品種，生長必較緩慢，諸塊較小，收量也少。


在新竹地區經多年試驗結果，以「新竹一號」最適於糊仔栽培，有意栽培的，可以準備自給採麥團，種苗請向當地農會採種團洽領。

秋分以前插苗 糊仔甘諸以插後一個月的生長最為重要，所以，插植甘薯，應在九月上、中旬，即在一秋分前完成工作，過遲則影響生長減低收量。

插植方法 甘薯苗以八節苗最為適宜，株距二十五至三十公分，將苗平放於小畦中央，取土蓋第一節與第五節處（請看圖四）。如全

苗蓋土甚多，則培土時容易覆土過厚，增多細小塊根的

形成。糊苗後放水灌溉，並將兩邊稻株各向左右押開，使照射陽光，促進生長。




（土蓋節五第節一第）苗糊上畦小在：四圖

準備


家經濟影響很大。因此，乃有人利用二期作裏作田栽培糊仔甘，但因所用方法不適當，常致延誤至年第一期作的插秧期，或是得不到理想的產量。新竹區農業改良場經過多年的試驗，證明改用下述的方法栽培糊仔甘，不但可以把握收穫期提早，避免對翌年第一期作插秧期的影響，同時還可以使產量增加一倍以上。

選定土地 新竹地區冬季有季節風與小雨，所以宜選擇：

- ①有防風林的土地
- ②能够灌溉，排水良好而肥沃的土地。



行空留預時秧插：一圖



肥堆熟末或草稻施上行空在：二圖

插苗

選定甘諸品種 糊仔甘諸與春秋作不同，

如為粘質土，因為在作畦後土壤容易乾燥硬化，阻碍甘諸的生長，所以，最好等到插苗前一天下午才樂畦。

施肥培土

水稻刈前

- ①在插苗後十天，利用下小雨時，在甘諸旁邊施用硫酸銨或尿素，每十公畝（一分地）五公斤。如為晴天，可用水稀釋灌注，以助初期發育。
- ②水稻收割前一天，將伸長在稻

消炎化膿症

所有炎症一日服一次整天有效
免除一日數服的麻煩



比較其他消炎片
價廉效大
△購買時請認明金黃錫紙上
印有英文字樣包裝（藥房均售）

最新速效持久性消炎片



全無苦味 小兒易服
小兒請用オムニボン糖漿（シロツブ）