

株間的甘藷葉抽放在小畦上，以減少在收刈時遭受損傷。
收刈水稻時，宜將水稻稻蔸低刈至地際。

水稻收刈後

①水稻收刈後，將稻草踏填於小畦邊的小溝中，填至九分滿時，撒施氮化鈣（鳥肥）。畦的另一邊可施堆肥、過磷酸鈣及氯化鉀，作為追肥（請看圖五）。

小溝中的稻草經撒施氮化鈣並

覆土後，因酸酵分解而發生熱度，成為溫床，有促進根部生長的效果。酸酵分解後變為堆肥，又可增加土中的有機質。

②施完肥料後，用蜈蚣犁犁起兩邊稻株行土，再用鋤頭培土作成甘藷畦。（請看圖六）

培土以不埋沒甘藷基部為準。將普通犁犁壁拿掉，也可以代替蜈蚣犁使用。

每十公畝地肥料施用量如下：


肥料種類	施用量
硫酸銨	五公升
氮化鈣	一二公升
過磷酸鈣	一五公升
氯化鉀	二〇公升
堆肥	七五〇公升

病蟲防治

糊仔甘藷的病蟲害較少，但到雨期排水不良時，容易發生縮芽病。發病時宜即摘除被害部份燒毀，或撒佈四、四式波爾多液。

糊仔栽培期間氣溫低蟲害發生較少，在生育期中撒佈二五% DDT 乳劑，或一五% BHC 粉劑一二次，以防治甘藷象鼻蟲。

即註：波爾多液四式波爾多液例如下：硫酸銅四公分，生



肥施後稻水刈收：五圖

採收

插苗後滿五個月即可採收。選擇晴天，先用芒鏟挖去藤葉後，型開畦的兩邊，用鋤頭深掘殘留的畦中央部而取出甘藷。

糊仔甘藷塊根深生在地中，採收時應深掘以避免損傷。

農業小知識

△抽園廢耕後，最好種其他作物，經五至十年後再種柑桔，否則柑桔發育不旺盛。（蔡）
△馬鈴薯的枝葉，也可以利用為豬的青飼料，營養價值與甘藷相似，但是纖維素較甘藷多，所以不宜多用。每豬每日給與量以日糧一〇%為適度。（李）
△在本省栽種梨樹，以山地較為適宜。優良品種有「水梨」「黃皮梨」「橫山早生」及「長十郎」「廿世紀」等。（王）



畦果土培：六圖

不要愁

如發覺發熱頭暈，噴嚏，惡寒流鼻涕等即是患了感冒的前兆請立刻服用「傷風克」。臨床已經確證。

這次感冒會發熱，頭痛，全身發酸痛等現象如感冒上流病況時連服用傷風克（成人三粒配服氣藥素 Keromycin 一粒小兒依年齡減量）效果加倍一服即癒。

傷風克的特點：具特效，因本藥由多互相增強其對傷風症，効確實作用迅速臨床可對各種傷風症狀皆種成份巧妙配合能使狀之治療効用。●藥已經確證早期服用可

避免其他之嚴重病症，流行性感冒，鼻

之發生。④配合維他命B₁可充分補給因感冒所引起之諸症。包裝

使其迅速恢復健康。⑤絕不損胃腸無副作用。無論預防或治療

均如神效男女老幼孕婦均可安心服用。●傷風克的主治。四季感

其辦法如下：

①傷風克空盒拾金寄交「豐原鎮中正路一四八號萬仁化學製藥公司收」以便預先登記於本年十二月開始發贈美贈萬年日曆壹個敬請貴愛用者踴躍惠寄為荷。內藥字三七六七七號字二五二八。（廣告）

②金十字胃腸藥

③傷風克空盒或

拾個亦可，將上列空