株間的甘藷蔓抽放在小畦上，以減少在收刈時遭受損傷。

收刈水稻時，宜將水稻稻藁低刈至地際。

水稻收刈後

①水稻收刈後，將稻草踏塡於小畦邊的小溝中，塡至九分滿時，撒施氰氮化鈣（烏肥）。畦的另一邊可施堆肥、過磷酸鈣及氯化鉀，作爲追肥（請看圖五）。

小溝中的稻草經撒施氰氮化鈣並覆土後，因醱酵分解而發生熱度，成爲溫床，有促進根部生長的效果。醱酵分解後變爲堆肥，又可增加土中的有機質。

②施完肥料後，用蜈蚣犁犁起兩邊稻株行土，再用鋤頭培土作成甘藷畦。（請看圖六）

培土以不埋沒甘藷基部爲準。將普通犁犁壁拿掉，也可以代替蜈蚣犁使用。

每十公畝地肥料施用量如下：

肥料種類	施用量
硫酸錏	五公斤
氰氮化鈣	一二公斤
過磷酸鈣	一五公斤
氯化鉀	二〇公斤
堆肥	七五〇公斤

二期稻作病蟲害

可能較往年嚴重

好最果效・治防作合

據農復會技正張德慈在本省各地視察的結果，本年第一期稻作內螟蟲與紋枯病的發生情形，遠較往年同期普遍而嚴重，致使第一期稻作遭受相當嚴重的損害。目前，第二期稻作即將下種或插秧，田間有很多螟蟲幼蟲留存於稻樁或蘿草內，黏留於病株殘物上的菌核與孢子也很多，如不加精密防除，則第二期稻作勢必受到極大的損害，希望各位農友注意第二期作的病蟲害防治工作，千萬不可鬆弛。

張技正並指出，因螟蟲幼蟲數目很多，單靠農友個別的防治是不够的，必須做到完全的合作防治，才能見效，希望各鄉鎮農會與公所的推廣人員，組織這種團體。

在防治紋枯病方面，「多穗」與「阿蘇仁」二藥劑在往年中已充份發揮其高度效果，應多多施用。此外氮肥的施用不宜過多，應與磷鉀肥配合，以免減輕水稻的抵抗力。

病蟲防治

糊仔甘藷的病蟲害較少，但到雨期排水不良時，容易發生縮芽病。發病時宜即摘除被害部份燒毀，或撒佈四—四式波爾多液。

糊仔栽培期間氣溫低蟲害發生較少，在生育期中撒佈二五%DDT乳劑，或一五%BHC粉劑一至二次，以防治甘藷象鼻蟲即可。

註：四—四式波爾多液的調配比例如下：硫酸銅四公分，生石灰四公分，水一公升。或硫酸銅十二臺兩，生石灰十二臺兩，水一百八十臺斤。



圖五：收刈水稻後施肥

採收

插苗後滿五個月即可採收。選擇晴天，先用芒鐮刈去藤蔓後，犁開畦的兩邊，用鋤頭深掘殘留的畦中央部而取出甘藷。

糊仔甘藷塊根深生在地中，採收時應深掘以避免損傷。



圖六：培土築畦

・農業小知識・

△柚園廢耕後，最好種其他作物，經五至十年後再種柑桔，否則柑桔發育不旺盛。（蔡）

△馬鈴薯的枝葉，也可以利用爲猪的青飼料，營養價值與甘藷蔓相似，但是纖維素較甘藷蔓多，所以不宜多用。每猪每日給與量以日糧一〇%爲適度。（李）

△在本省栽種梨樹，以山地較爲適宜。優良品種有「水梨」「黃皮梨」「橫山早生」及「長十郎」「廿世紀」等。（王）

不要愁

如發覺發熱頭暈，噴嚏，惡寒流鼻涕等即是患了感冒的前兆請立刻服用「傷風克」。臨床已經確認。

這次感冒會發熱，頭痛，全身發酸痛等現象如感覺上述病況時連服用傷風克（成人三粒配服氣黴素 Keromycin 一粒小兒依年齡減量）效果加倍一服即癒。

傷風克的特點：具特效，因本劑由多種成份巧妙配合能使互相增强其對傷風症狀之治療効用。㈠對各種傷風症狀皆効確實作用迅速臨床已經確認早期服用可避免其他之嚴重病症之發生。㈡配合維他命B_1可充分補給因感冒所消耗的維他命而使其迅速恢復健康。㈢絕不損胃腸無副作用無論預防或治療奏効如神男女老幼孕婦可安心服用。「傷風克」的主治。四季感冒，流行性感冒，鼻炎（流鼻涕）氣管支炎，頭痛，發燒，關節痛，咳嗽，因感冒所引起之諸症。包裝：六片裝，二十片裝。「傷風克金十字胃腸藥」愛用者的好消息，本公司備有美麗萬年日曆贈送愛用者其辦法如下：①傷風克空盒拾個。②金十字胃腸藥鐵內藥品上之付像封絨拾張。③傷風克空盒或金十字封絨貳種合寄拾個亦可，將上列空盒寄交「豐原鎮中正路一四八號萬仁化學製藥公司收」以便預先登記於本年十二月開始發贈美麗萬年日曆壹個敬請貴愛用者踴躍惠寄爲荷。內藥字三七六七葡檢字二五二八。（廣告）