

原封農藥供應總匯



美國好連牌...
→ 安特靈(エンドリン)



美國金霸牌...
→ 巴拉松(パラチオン)
水和硫黃劑 98.5%



荷蘭農利牌...
→ 富收多(ホスビドール)
馬拉松(マラソン乳劑)



西德拜耳牌...
→ 固殺松(コサチオン)
米賜多(メタシストツクス I)
多穗(ツーゼット)



美國羅門哈斯公司...
→ 大生Z78(ダイセン)
大生M22



西德開地化學公司...
→ マラソン25%水和劑



日本日產化學公司...
→ 土壤殺蟲劑
(ヘプタクロール 2.5%
粉劑)



美國賜德來植物油公司...
→ 蛋白質瓜果蠅引誘餌
(スターレ)

其他各國名廠出品各種農藥均有

直接進口商

東益貿易股份有限公司

臺北市天水路二號之四 電話 43802



量肥施準標項公每生花作秋

栽培秋作花生注意事項

江翠

距離宜密
秋作花生
生育期只
要一百一十
日左右，比
春作約早十
至十五日，
但每株所結
莢果比春作
的少，所以應縮短株行距，增加株數，以提高產量。
一般以行距三十至三十五公分，株距十公分為最佳。

注意灌溉排水

五十至一百公斤。

栽培秋作花生，氣候環境與春作恰好相反；就是說，春季栽培花生，初期雨水少氣溫低，到中後期則雨水多氣溫高；而秋季栽培花生，在初期雨水多氣溫高，到後期則雨水少氣溫漸降；所以，應該針對氣候環境，改善栽培方法，方可獲得較高的產量。

要提秋作花生單位面積的產量，最要緊的是早播，關於這一點，上期本刊已有專文報導，下面要和各位討論的，是播種深度、密度，以及施肥、灌排水的問題。

播種宜深

本省七、八月間，常下豪雨，秋作花生如播種過淺，覆土太薄，則種子易為雨水所沖，暴露土面，減少發芽率。所以，栽培秋作花生，播種溝宜較深，通常的沙土及沙壤土，都應在十公分左右。

充份施肥

秋作花生，在初期雨水充足，施用肥料效果良好。所以，在整地時施用肥料，或在生育初期始花期前作追肥施用均可。
每公頃施肥量：堆肥一萬公斤，硫酸銨五十至一百公斤，過磷酸鈣一百五十至二百公斤，氯化鉀

△贈送種子啟事▽

「漳浦中生白菜」，新竹縣竹北鄉會瑞龍農友採種，每份重量三分，共一千份，送完為止。有意栽培者，請按照下列次序：①先準備一信封，信封上寫本人的姓名住址，貼郵票八角。②將這一信封，裝在另外一個信封裏。③封好貼郵票八角，信封上註明「茶種」二字後寄「臺北市中山北路二段四十三號豐年社」。

秋作花生，在九月中旬以後即有旱象。這時候，剛好是花生莢果的形成期，如過份亢旱，必致產量低減，品質變劣。所以，在亢旱時應施行灌溉一至二次，這樣可提高收量二五%以上。
但在生育初期雨水過多時，應注意排水，以免病害發生。