


(Libatis)與羅布斯麥(Robusa)較少，前者目前栽培有二百多公頃，適宜栽培於本省中南部及東部海拔300-700公尺，避風之山地，土壤以富含有機質之壤土為宜。定植後二年可以開始採收果實，四年生以上，每公頃平均可收穫咖啡豆一、〇〇〇公斤，目前價格每公斤約四十五元。(朱慶國)

荔枝的落果原因很多 如蟲害及土壤太乾等



家鄉有拾餘株廿多年生的黑葉種荔枝樹。今年結果看去成績相當好，數年來都是用水泥包裝紙製成紙袋在這一個時期套袋。現在打算用以下方法，不知道對不對？一、本人住苗栗，荔枝蛋白質及香油，誘殺葉實蠅，請問此法效果如何？可不可靠？在苗栗方面平常在荔枝成熟前二、三星期葉實蠅非常猖獗，完全用此藥劑確有實效否？(臺北市黃鍊石)

【答】：荔枝的落果原因很多，如①蟲害：②土壤太乾旱，缺乏水分或氣候不正常，久旱後突然大雨；③施肥不足等。若只是由於蟲害而引起落果，你應在套袋前先噴佈馬拉松乳劑，防治實蠅，然後套袋。為害荔枝幼果的害蟲有果蠹蟲、捲葉蛾、毒蛾等，果實蠅在果實將成熟時侵襲，用誘殺劑誘殺此蟲，當然可以防止一部分果實的損失，但對果蠹蟲等無效。所以還是應該在噴藥後套袋。(蔡致謨)

柑園土壤若呈酸性反應 可施用消石灰翻犁土中

【問】：(1)如果天牛蛀入柑樹內有何方法殺死它？(2)柑桔所需的石灰每株三年生的要多少？是否是建築用的石灰？可以和肥料一起用嗎？(3)聽說柑桔在定植後還要移植。是嗎？(三年生、一年生均有)是否一年生的要移植？(高雄縣鍾兆龍)

【答】：(1)天牛幼蟲蛀入樹幹，可用鉛絲穿入孔中鉤出它；(2)若蟲孔彎曲，

無法使用鉛絲鉤出，則可用棉花蘸二硫化碳液塞入蟲孔中，而堵塞孔口，則幼蟲自會因二硫化碳之有毒蒸氣而被毒死。(注意：二硫化碳易着火，它的氣體對人也毒，應用時須小心。)(2)柑園需否施用石灰，視土質而定，若土壤呈酸性反應，則需施用石灰，酸性弱者每年每畝施三五公斤，酸性強者，每甲每年施一二五公斤，所用的石灰是「消石灰」，(又名「風化石灰」。)不可用「生石灰」。把消石灰均勻撒佈土面，再翻入土中，適於柑桔的土壤反應是微酸性的，(它的pH值是六。)(3)既稱「定植」就不再移植。通常柑農購買一年生柑苗時，因苗太小，特為選一塊良好土地「假植」(暫時種植之意)，好好肥培一年，再定植園中，這樣可以經濟利用土地。大苗(三年生苗)假植培養一年再定植，是不值得的，因大苗移植時根群損傷較多，妨礙柑苗發育。所以購買三年生苗，宜立即定植。(蔡致謨)

防治冬瓜蚜蟲為害 宜施用魚藤精乳劑

【問】：一、冬瓜若依貴刊十一卷九期一瓜類的整枝技術一節時，如何防止病蟲由切口侵入(可否以大生78，四百倍液，塗或噴酒切口)？二、防治冬瓜之蚜蟲為害，使用何種農藥即無藥害，而且最能收效？此藥臺北市可有出售？三、為同時防治冬瓜疫病和炭疽病可否用大生78與大生22混合液噴酒之？如可以藥液如何調配？(臺北縣鄭守敬)

【答】：一、冬瓜整枝應選晴天行之為宜，切口用硫黃華塗抹為好，但晴天整枝時似無此必要。二、防治冬瓜蚜蟲宜用魚藤精乳劑六〇〇—一八〇〇倍。又硫酸於鹹四〇〇—一五〇〇倍液(本省製)也非常有效。全省種子商及農會都有出售，硫酸於鹹也有日本及英國製品在臺北市出售。三、防治冬瓜疫病及炭疽病，預防時用大生七八、四〇〇倍液，初期發生用大生二二、四〇〇—一五〇〇倍液為宜。附註：最近冬瓜如發生變割病用Solotain液噴射為宜。(王進生)

武田老牌 最新農藥

武田滅爾錠劑
(武田メル)
稻熱病
最新特效藥!

安特靈 19.5% 乳劑 (エンドリン乳劑) 武田マイシン ペスタン	飛佈達 2.5% 粉劑 20% 乳劑 (武田ヘプタ) 滅爾波爾多-18 (メルボルド-18)
--	---

日本武田藥品工業株式會社
農藥總代理 **立大貿易有限公司**
臺北市太原路55號三樓 電話：48170

新台幣1元~3元
盒 聖片
A.C.M

養鷄專家 已經算出來!
如果家禽發生疾病
最可靠最簡單
最最好最簡便
最易最易

——最高抗生素+3種磺銨劑——
衛試藥字第2390號
藥房·飼料行·農會均售

太平洋製藥廠
臺北市中山北路1段105巷90號