

公牛去勢後的管理

黃壽華

公牛去勢後，如果護理不得當，則易使傷口癒合不良，有損畜體的健康，尤其可慮的是，萬一感染到破傷風症，那後果就很嚴重了。

八、九月間，是公牛去勢最適宜的季節。各位也許正忙著向鄉鎮公所辦理申請去勢手續，而鄉鎮公所聘用的獸醫人員，不祇技術高明，而且消毒週到，可說是萬無一失。

可是，去勢後如果護理不得當，則仍易使傷口癒合不良，有損畜體健康，尤其可慮的是，萬一感染到破傷風症，那後果就不堪設想了。茲將公牛去勢後應注意事項略述於後：

注意牛舍衛生

破傷風病菌最愛寄存於陳舊的牛糞上，去勢後二週內，應時時留意牛舍及四週的清潔，保持乾燥，絕不能有糞尿停滯，以免粘到污物，並且每日要用三%「複方煤溜油醇」消毒一次，禁止在驢地如垃圾或堆肥附近放牧。此外，還應注意牛舍裡的通風，也不能在日光下曝曬。

減少工作

牛在剛去勢後，體力還沒完全恢復，同時因為傷口發炎作痛而舉動不安，如口癒合，對畜體健康的影響也很大。

去勢後，絕對要避免打撲或互鬪等情事發生，尤應注意驅除牛虻、蚊蠅，以防傳染病菌或因叮咬而再度引起發炎。

避免打撲

公牛去勢後數日內，食慾稍減，如營養不良，將影響體力的復原，與傷口的癒合。供給足量青草，並喂秣皮一次，以補營養之不足。

注意營養

公牛去勢後數日內，食慾稍減，如營養不良，將影響體力的復原，與傷口的癒合。供給足量青草，並喂秣皮一次，以補營養之不足。

留意傷口

在傷口未完全痊癒之前，絕對禁止全身沐浴，以防污水觸及傷口，傳染病菌或引起發炎。去勢後三天，如傷口腫脹，是正常的現象。但如一週後腫脹未見消除，應請獸醫重行傷口消毒，並打消炎針（如盤尼西林或磺胺藥劑）。

農·業·小·知·識

△二年生的柑桔園，如株間距離在七公尺以上者，可以間作一期鳳梨。柑桔和鳳梨都要充分施肥，這樣對於柑桔樹的生長不會有多大影響。（蔡）

△山芋頭可以利用為養豬的部份飼料，削簽煮沸後立即餵給，不要久置，久置後必敗壞，對豬有害。（李）

△龍眼因生長強健，又能適應本省風土，所以到處生長。荔枝則不然，非在土層深厚，地下水位高的土地，不能發育繁茂，而且需要週密的肥培管理，才會大量結實。（蔡）

△荔枝除高壓外，也可以用嫁接繁殖，接在荔枝砧上，但因成活率低，而接枝發育遲緩，所以放棄不用。（蔡）


△二十餘年前夏威夷有報告說，荔枝接在龍眼砧上獲得成功，但在菲律賓及光復後嘉義農業試驗分所屢次試驗皆未成功。從植物學上判斷，兩者不同屬，習性相差相當遠，恐不能接活，即使能接活，接本發育也不會好。（蔡）



再來訂婚的阿真
來訂婚的阿真
訂婚的阿真
訂婚的阿真
訂婚的阿真
訂婚的阿真
訂婚的阿真
訂婚的阿真
訂婚的阿真
訂婚的阿真



雙相人魚走了後
雙相人魚走了後
雙相人魚走了後
雙相人魚走了後
雙相人魚走了後
雙相人魚走了後
雙相人魚走了後
雙相人魚走了後
雙相人魚走了後
雙相人魚走了後



再來訂婚的阿真
再來訂婚的阿真
再來訂婚的阿真
再來訂婚的阿真
再來訂婚的阿真
再來訂婚的阿真
再來訂婚的阿真
再來訂婚的阿真
再來訂婚的阿真
再來訂婚的阿真