

防治食棉果的害蟲

可用安特靈乳劑等



【問】：一、對於食棉果的害蟲噴那種殺蟲劑才能防除？好久噴霧一次？
二、棉花施那幾種肥料好？以一分地來講，施量好多？
三、葉長得太盛是否可以剪掉？（臺南縣張在受）

【答】：一、本省食棉果之害蟲多為大紅鈴蟲或棉鈴蟲，應在發生時，隨時噴藥防治。在其發生初期應於四百至六百倍一九·五%之安特靈乳劑稀釋液內，加用二五%DDT乳劑二百五十倍，或七五%DDT可濕性粉劑七百五十倍稀釋液，噴藥次數，應視害蟲發生程度而定，約為每隔十天至左右噴一次，每公頃用量，則應視棉作生長時期而定，約為八百至一千五百公升。

二、棉田施肥應視土壤肥瘠棉苗生長情形而定，肥料種類，可視三要素之含有量，作適當之配合。一般標準每十公畝（約一分地）施用堆肥一千二百公升，硫酸銨三十五公升（或改用尿素一五·八公升）過磷酸鈣十五公升，氯化鉀十三公升。

三、棉株生長過於繁茂，則將妨礙通風透光，阻碍噴藥治蟲工作，故在不影響棉株正常發育之原則下，可以去除部分葉片。（李景元）

落花生有地老虎害蟲

可用阿特靈粉劑防治

【問】：我本李種植「豪農一號」落花生，在此發育後期，發現植株立即乾枯而死。經檢查土內根部被害蟲咬斷，經掘土並未發現害蟲存在。不知究竟何種害蟲，特將樣本隨函奉上，敬請指教。（花蓮縣仇志堅）

【答】：依來信所云，大概是小地老虎所為害，今後請在種植花生前，先用四〇%阿特靈可濕性粉劑，以每公頃用十二磅半之用量，處理土壤防治之。（陶家駒）

木耳原木發生綠黴病

防治方法可噴撒大生



【問】：我種植木耳，有部份原木上發生綠色之害菌（附上標本即袋裝之木片），請問用何種殺菌藥可予防治？（高雄市區煙南）

【答】：附寄來的木耳原木病害，經檢定為綠黴病，防治方法噴撒大生七八粉劑，可阻止本病之發生，同時使其通風良好。降低濕度亦可收防治之效果。（胡開仁）

各菌類所需要的養份

分有機質無機質兩類

【問】：一、我已親身訪問貴社廣告人「東勢養菌園主」據云，香菇收成期僅五月第一年百斤原木可收十五斤。木耳三十天可採收，第一年百斤原木可收二十斤以上，是否

豐收可靠的秘訣請使用

綜合微量要素葉面散布劑

施葉養元
シオヤゲン

農作物的預期可靠收穫·改良品質·預防病害...
「施葉養元」是與肥料·農藥為農家不可缺少的必需品。



不靠天·只靠施葉養元年年必豐收
「施葉養元」的效能

1. 防止萎黃病·腐心病·萎縮病
2. 特別對於稻熱病有抵抗力
3. 加強病蟲害及倒伏之抵抗力
4. 促進植物生長及發育提高品質
5. 使用本劑可獲增收二成至六成

日本 株式會社シオヤゲン本舖出品

說明書備索即寄

臺灣總代理 英達貿易有限公司

臺北市華陰街39號 電話 46980


最新強力殺蒼蠅藥

特效 安全 經濟 衛生

滅蠅餅

蠅 ナ ツ ク ス

- 特點：
1. 蒼蠅一碰蠅餅立即死亡
 2. 滅蠅效力強大持久不變
 3. 每塊可繼續使用一個多月
 4. 用法簡單合乎衛生
 5. 白天滅蒼蠅，夜間殺蟑螂



日本 キンダ除蟲菊株式會社出品

各地藥房農藥行均售