


可靠？二、本省有無上等川耳菌供應，採收期及收量幾何？三、請賜告各園種之採種技術以資研究。四、各園類所需之養份為何？（湖口黃錫坤）

【答】：一、在適當的技術與環境下，香菇及木耳採收期和產量有此可能。二、本省目前無上等川耳菌出售。三、兩種採種技術，請參閱中國農村復興聯合委員會四十五年二月出版「西洋菌培養法」。四、各園類所需要之養份，不外有機物質及無機物質兩大類，詳細成份請參閱臺北市衡陽街大陸書店出售「キノコ類培養法」一書。（胡開仁）

水稻耐寒品種「圓粒」

本省中南部可栽培



【問】：一、十期豐年中刊有水稻耐寒品種適於二期作之「圓粒」種何處有售？蓬萊光復四百零一號何處有生產？員產粒量如何？二、砂質之土壤新田「所施用肥料是否硫酸混合」一加里或混合過磷酸，那種較佳？前數期豐年刊有砂質土施過磷酸肥比過硫酸為佳，已經試驗過所謂過磷酸肥是否指「加里」？三、磷肥是指何肥，鉀肥是指何肥？四、敵地栽種陸稻都是雜種不清潔，請轉農試所把育成之農早一號與二號種贈與敵地農民試種，請速代轉以趕在二期下播。（花蓮縣陳平順）

【答】：一、水稻耐寒品種「圓粒」，僅適應於二期作栽培。本品種中南部均可栽培。自苗栗以迄屏東，各地農民均可有種子。貴處需要，以向苗栗縣農會接洽為宜。根據過去調查園粒每公頃平均產量二千六百七十一公斤。貴處如希望種兩期作，本所育成「農早一號」及「二號」可供應種子試種（一年可種二次），已囑本系經營單位負責人寄奉「農早一號」一公斤。即可做秧田下種。二期作本田生育期三個月。

二、砂質土新墾地宜多加堆肥，以期改良土壤物理性質，並保蓄肥分。在砂質新墾地，氮、磷、鉀三種肥料要素（硫酸、過磷酸石灰或過磷酸、加里（即鉀素），普通早田

可用氯化鉀），均需要補充。依作物不同，施用分量不同。可參考作物書籍辦理施肥作業。又溶磷為磷質肥料之一種，並非「加里」。普通早地如種甘藷，用過磷酸石灰或溶磷均可。又鉀肥日名「加里」，普通水田用硫酸鉀，旱地可用氯化鉀。（繆進三）

馬鈴薯種薯貯於冷處在旱地栽培不可連作



【問】：春作的馬鈴薯留在後期作種應如何保存，不致影響發芽率？結球白菜收穫後，可否栽培馬鈴薯？馬鈴薯可連作嗎？馬鈴薯將來的銷路如何？（新竹縣曾赤金）

【答】：一、春作馬鈴薯收穫後留至本年第二期裏作栽培其貯藏期間約一五〇天。馬鈴薯種薯在攝氏三五度以上之高溫之下，約五十五天左右休眠被打破，就開始萌芽故通常春作種薯貯藏至裏作栽培頗困難。最理想的貯藏方法是冷藏，將種薯貯於華氏三六—四十四度，相對濕度八五—九〇%之下可保持五—六月不發芽，也不爛，但一般農家無法做到，故請將種薯貯於較冷的場所，最好放在竹架棚上排成二層（不可堆積很高），那麼約六十一七十天就開始萌芽，萌芽後曝曬斜光線以謀芽短大，避免徒長為宜。二、結球白菜收穫後除結球白菜園曾有發生極烈的軟腐病之外，可栽培馬鈴薯。三、馬鈴薯在旱地不可連作，採用三年輪作制度為宜。但在水田因裏作之後栽培水稻二期，不妨連作。四、馬鈴薯不但內銷，也可外銷，故銷路毫無問題。但品質較差的品種，不適外銷及內銷，故應栽培男爵及農林一號兩種，早期栽培應栽培五峰種。（王進生）

綠豆有三個品種大粒種較為早熟

綠豆有三個品種

【問】：一、綠豆結莢之多少和粒數之多，因品種的關係，對種植方法沒有影響麼？二、目前那一種品種最好，三、怎樣種植才能使綠豆增產？四、臺中地區綠豆之種植時期在何時？五、花生收成後之土地，可

荷爾蒙尿素葉面撒佈露劑

好綠靈

即ホモグリン



效能

1. 水稻噴霧2次可增收3成以上
2. 瓜類、柑桔、蔬菜、豆類、噴霧2-3次可增收5成以上
3. 能提高病蟲害抵抗力
4. 能防止發生立枯病、落花、落葉、腐根、使稻樁強壯，樹勢旺盛，增加結實

成份正確 效能保證

使用綜合微量要素葉面撒佈劑

大豐收 液劑 保證大豐收



不遜外貨 歡迎賜顧
ホモグリン植物
オルモン劑即是
『好綠靈』
確保豐收，信用可靠
品質超越，榮譽出品
研究成功，正豐化學
大貢獻！貢獻！

請選用正豐農藥（農林廳檢驗合格證第〇〇六號）

票貳元即寄來函付
郵試用樣品說明書

臺中縣霧峯 正豐化學股份有限公司 榮譽出品