

否立即播種綠豆？（臺中縣朱榮）

【答】：一、綠豆結夾之多少和粒數之多少是由於品種與不同的栽培管理方法而有關係的，如大粒種比小粒種結夾稍少，又在三、四月播種者結夾較少，氮肥施用過多者或不施用肥料亦結夾不良。二、綠豆有大粒種、中粒種、小粒種之三個品種，其中大粒種比中、小粒種稍早熟，且價格還貴一點。三、（A）栽培在排水良好的砂質壤土；（B）選擇純潔且豐滿之種子；（C）種植不要太密（行距三十公分株距十二公分）；（D）適當的施肥量（每分地施用硫酸銨十公升過磷酸銨二十公升氯化鉀十公升）；（E）注意病蟲害之防除；（F）適期播種。四、種植時期五月下旬一七月上、中旬。五、最好不要與花生輪作栽培，因為豆科植物是不可以連作的。（陳師亮）

七里香一年兩次採種

撒播於沙土混合苗床

【問】：請問七里香（月橘）之播種時期在何時？②播種育苗的方法如何？③管理上應注意什麼？④如何留種？如何保管？（臺南縣黃明華）

【答】：①七里香一年可分兩次採種，春季三—五月，秋季八—十月，並於採種後陰乾，立即播種，如放置過久發芽力會消失。②播種最好撒播於沙與土混合之苗床中，上覆薄沙一層，週內即可發芽。如行露地播種，應先作畦，將土儘量打破細碎，並撥放腐熟堆肥少許，混合後即行撒播上覆稻草，以防治烈日直曬保持土內濕度。③管理上除隨時注意澆水外，即為防蟲，病害則較少。④果實紅色後即可採收。內有種子一、二粒，放入木桶中，浸水用手搓擦，將外皮脫落洗滌後種子下沉，取出陰乾或曬乾，於十日內即行播種，過久則發芽力消失。（王光全）

尿素飼養豬隻

何在試驗階段

【問】：（一）據本鄉某一農友前來本會告稱，聽聞現在有部份農友採用化學肥料之



尿素，用作豬的飼料，且其生長非常很快，並比其他飼料為經濟而有利乙節，請貴社代為調查，是否可以用於飼料，其方法如何及試驗效果怎樣？（嘉義縣王火山）

【答】：以尿素飼養豬隻，歐美尚在試驗階段，我國尚無機構加以試驗，惟臺灣糖公司曾於三年前利用以酵母與尿素混合從事奶牛飼養試驗。因據歐美及日本試驗結果，認為反芻動物（如牛羊等）第一胃中之微生物，能在消化過程中，並在適當條件的配合下，可以把尿素轉變為動物可以利用的蛋白質。因豬屬單胃動物，其能否有效利用尿素，使它轉變為可利用的蛋白質，須待從事飼養試驗之後，方可決定。各位農友在未獲得試驗結果和推廣之前，最好不要冒然試用。（周光宇）


仔豬先天性發育不良

注意母豬懷胎期營養

【問】：我的母豬分娩順利，生產七隻，死胎三隻，在此七隻中，生下時，平均大小差不多，但是經哺乳二、三星期以來，其中一隻，不但長不大，反而益形消瘦同生時一樣大小。請問（1）是何原因？是否營養不良？（2）用何方法治療？（3）前一胎也有一隻，但以尚未無經一個月以後即死亡。如是因母豬關係，用什麼方法預防？（臺中縣湯振松）

【答】：一、照你家的母豬分娩情形來看，在生產十隻仔豬中竟有三隻死胎，此可能是在母豬懷胎期中營養不足，致影響仔豬先天性發育不良，生下的仔豬不會正常。二、這隻不長大的仔豬予以淘汰，否則與別隻好的仔豬分開飼養，或用人工哺乳法試試看。三、這隻母豬前後已有二次發生這種情形，此後在母豬配種前後及懷孕期中要注意飼料

野田式耕耨機



◎詳細說明書函索即寄 ◎徵求各地代銷處
新 型 美 觀 性 能 優 異
耕 耘 最 深 操 作 安 定
運 搬 力 強 保 證 滿 意
誠 實 服 務 歡 迎 比 較

臺灣 宏業商行農機部
總代理

臺北市重慶北路二段四號 電話：四二五九二

永光農藥
TRADE MARK



信用最好
MARK



進口各種名牌農藥

永光農化工廠

台中市成功路276·電話4661·