否立即播種綠豆？（臺中縣朱琴）

【答】：一、綠豆結夾之多少和粒數之多少是由於品種與不同的栽培管理方法而有關係的，如大粒種比小粒種結夾稍少，又在三、四月播種者結夾較少，氮肥施用過多者或不施用肥料亦結夾不良。二、綠豆有大粒種、中粒種、小粒種之三個品種，其中大粒種比中、小粒種稍早熟，且價格還貴一點。三、（A）栽培在排水良好的砂質壤土；（B）選擇純潔且豐滿之種子；（C）種植不要太密（行距三十公分株距十二公分）；（D）適當的施肥量（每分地施用硫酸錏十公斤過磷酸鈣二十公斤氯化鉀十公斤）；（E）注意病蟲害之防除；（F）適期播種。四、種植時期五月下旬—七月上、中旬。五、最好不要與花生輪作栽培，因爲荳科植物是不可以連作的。（陳師亮）

七里香一年兩次採種
撒播於沙土混合苗床

【問】：請問七里香（月橘）之①播種時期在何時？②播種育苗的方法如何？③管理上應注意什麼？④如何留種？如何保管？（臺南縣黃明善）

【答】：①七里香一年可分兩次採種，春季三—五月，秋季八—十月，並於採種後陰乾，立即播種，如放置過久發芽力會消失。②播種最好撒播於沙與土混合之苗床中，上覆薄沙一層，週內即可發芽。如行露地播種，應先作畦，將土儘量打破細碎，並摻放腐熟堆肥少許，混合後即行撒播上覆稻草，以防治烈日直晒保持土內濕度。③管理上除隨時注意灌水外，即爲防蟲，病害則較少。④果實紅色後即可採收。內有種子一、二粒，放入木桶中，浸水用手挫擦，將外皮脫落洗滌後種子下沉，取出陰乾或晒乾，於十日內即行播種，過久則發芽力消失。（王光全）

尿素飼養猪隻
尚在試驗階段

【問】：（一）據本鄉某一農友前來本會告稱，聽聞現在有部份農友採用化學肥料之尿素，用作猪的飼料，且其生長非常很快，並比其他飼料爲經濟而有利乙節，請貴社代爲調查，是否可以用於飼料，其方法如何及試驗效果怎樣？（嘉義縣林聰惠）（二）現有一個問題請教。聽說尿素肥料可以養猪，這尿素配合其他飼料是否有化學變化？尿素是否確可做飼料養猪？（嘉義縣王火山）



【答】：以尿素飼養猪隻，歐美尚在試驗階段，我國尚無機構加以試驗，惟臺糖公司曾於三年前利用以酵母與尿素混合從事奶牛飼養試驗。因據歐美及日本試驗結果，認爲反芻動物（如牛羊等）第一胃中之微生物，能在消化過程中，並在適當條件的配合下，可以把尿素轉變爲動物可以利用的蛋白質。因猪屬單胃動物，其能否有效利用尿素，使它轉變爲可利用的蛋白質，須待從事飼養試驗之後，方可決定。各位農友在未獲得試驗結果和推廣之前，最好不要冒然試用。（周光宇）

仔猪先天性發育不良
注意母猪懷胎期營養

【問】：我的母猪分娩順利，生產七隻，死胎三隻，在此七隻中，生下時，平均大小差不多，但是經哺乳二、三星期以來，其中一隻，不但不長大，反而益形消瘦同生出時一樣大小。請問（1）是何原因：是否營養不良？（2）用何方法治療？（3）前一胎也有一隻，但以前未無經一個月以後即死亡。如是因母猪關係，用什麼方法預防？（臺中縣湯振松）

【答】：一、照你家的母猪分娩情形來看，在生產十隻仔猪中竟有三隻是死胎，此可能在母猪懷胎期中營養不足，致影響仔猪先天性發育不良，生下的仔猪不會正常。二、這隻不生長的仔猪予以淘汰，否則與別隻好的仔猪分開飼養，或用人工哺乳法試試看。三、這隻母猪前後已有二次發生這種情形，此後在母猪配種前後及懷孕期中要注意飼料

永光農藥　信用最好
TRADE　永光農藥　MARK
永光的農藥確實好
請用永光的好農藥
政府検験合格
登記証農藥第007號
パラチオン
巴拉松
乳剤47%
ピーエム
PM
乳剤50%
マラソン
馬拉松
乳剤50%
エンドリン
安特靈
乳剤19.5%
555EM.原子利美農藥
進口各種名牌農藥
永光農化工廠
台中市成功路276・電話4661・





野田式耕耘機
⊙徵求各地代銷處　⊙詳細說明書函索即寄
性能優異　新型美觀
操作安定　耕耘最深
保證滿意　運搬力强
歡迎比較　誠實服務
臺灣總代理　宏業商行農機部
臺北市重慶北路二段四號　電話：四二五九二