


·意注們友農請再

# 炎肺猪



一 葵 燐 翠

就不會發病了？

拜拜並不壞  
節約是應該

老金圖

所以，如天候不順，氣溫急變（乍冷乍熱），感冒，營養不良，環境衛生不佳，長途輸送，有寄生蟲等等，都是本病的誘因。

猪肺炎的主要病徵，就是發高燒（攝氏四十度乃至四十一度多），如果是急性的，還會引起全身症狀如惡寒戰慄，食慾廢絕，呼吸迫，倦怠呈敗血症，經過二至三天即死亡。一般病例，以慢性型的比較多；即發燒至攝氏四十度上下，食慾減少，精神萎靡，呼吸速迫乃至困難，有時呈腹式呼吸，流鼻涕（有時流膿樣鼻汁），咳嗽（噴出泡沫含有細菌，成爲傳染病源），便祕然後變爲下痢，營養不良，經過一兩週至數週後死亡。後期病猪，還常在皮膚上呈現紫紅色的血斑。

## 預防最為重要

在本刊第六卷第十期裡，我們曾經刊載專文，促請農友們注意防治猪肺炎，但是在今天，該病還是很猖獗，據統計，本省各縣市，每月都有數十頭至數百頭的病例發生，對養猪收益影響很大，農友們仍應注意防治該病。

### 病因複雜

豬肺炎的原因非常複雜，有的是由細菌引起的，有的是由病毒引起的，而最近在本省，又發現了由酵母菌所引起的一種肺炎，但是我最常看到的，還是由「巴氏桿菌」或「沙氏桿菌」所引起的肺炎（常稱為「豬肺疫」），而且常與其他病症，如猪瘟等同時發生。

據統計，本省各縣市，每月都有數十頭至數百頭的病例發生，尤其以本省北部冬天雨季為多。

本病雖是由細菌引起，但是只要猪很健康，抵抗力很强，那麼細菌也就無法作怪，猪也

此外，萬一  
發現病豬，應即  
隔離以防傳染。  
發生過肺炎的豬  
舍，以及掃帚或  
其他用具，也要  
澈底消毒。



。生發炎肺猪防預，潔清舍猪持保



時常大勞一統  
拜來有益而無害  
拜兼民勞而傷財



壞不約節的難國  
該應代時費浪改當應



七月鬼門開  
你拜我拜也  
大大家拜拜  
不心關不拜

我們又知道，寄生蟲寄生在豬身上，便會使豬的體力衰弱，引發肺炎。所以，在適當時期延請獸醫師替你的豬驅除寄生蟲，也是預防本病的好辦法。

治療需有耐心

前面已經說過，豬肺炎的原因很複雜，所以，治療也比較麻煩，但是如果能在發病初期即延請獸醫師作適當的治療，則仍可治癒。治療時，普通使用混合血清（含有許多種有效成份，有效期間二至三週）及抗生素、礦酸類等藥劑。治療本病，最重要的就是要耐性。因為抗生素、礦酸類藥品在施用後數小時就減低效力，所以必須在效力減低前再度注射，而且需繼續注射幾天方能達到圓滿結果；不然的話，就有復發或再惡化的可能。

因爲獸醫師工作繁忙，負責的區域又大，以致往往顧此失彼。有時又因爲畜主誤認爲獸醫反復用藥爲故意揩油，而不願繼續接受注射。這二點都要請特別注意。

## 肺水腫並不是豬肺炎

# 臺灣咖啡的量與質

本文爲嘉義農業試驗所朱慶國先生的解答。

## 問一：咖啡株間距離需有多少寬？

咖啡種植，可依地形而採用單行或雙行密植；前者行距二·三至二




五公尺，株距二公尺；後者每二行密植，該二行之行距爲一·二公尺，株距二公尺，每二行隔以二·八至三公尺寬之畦間，以便種植綠肥。

**問二：一株發育正常的五年生咖啡和十年生咖啡，其產量各約多少？**  
咖啡的產量，在合理管理之下，五年生單株平均產量為鮮果三公斤，每公頃以三千株計算，可收鮮果五千至六千公斤，折合咖啡乾豆約一千剪施肥得法，仍可達如此產量。

目前臺灣咖啡栽培面積僅有二百多公頃，以雲林縣經濟農場栽培最多，多為幼齡樹未達結果盛期，所以，目前省內銷售仍供不應求。

## 中美洲所產的優良咖啡

**問五：目前農家生產的咖啡豆賣給加工廠的價格若干？**  
亞拉伯種的咖啡乾豆目前賣給加工廠每公斤約四十五元。



善改要拜拜  
宴酒代花鮮  
錢費浪必何  
天動感心誠

人表代意民  
神敬雖拜拜  
信迷勿萬千  
人害真信迷

紳士鄉地各  
真認要約節  
人教公勸再  
勤般要善改