



## 養雞嚴重問題之一

### 新城鷄瘟

養過鷄的農友們都說新城鷄瘟可怕，沒有養過鷄的朋友們也一定會提醒你注意新城鷄瘟，甚至勸你打消養鷄的念頭。新城鷄瘟是一種急性的鷄傳染病，傳染力 very strong，死亡率也很高，可是只要注意日常管理與預防注射，本病是可以預防的。

新城鷄瘟是由一種過濾性病毒所引起的急性鷄傳染病，在本省，已有相當久的歷史，過去因本症普遍蔓延而招來的損失頗為慘重，以致許多人不敢嘗試大規模的養鷄。

#### 大鷄小鷄都會感染

新城鷄瘟的病毒活存在病鷄的各種臟器，以及唾液、鼻汁、淚汁或糞便內，經由工人、用具、飼料、鷄販、野鳥、鼠類等傳播，使未經預防注射的鷄感染致病。

新城鷄瘟的發生雖以秋、冬兩季較多，但是整年中都會發生，且不論鷄的大小都會感染。

新城鷄瘟有歐洲型與美洲型兩種，在本省發生的，依據研究考查，是屬於歐洲型的一種，一般症狀比較嚴重，死亡率也較高。

死亡率在九成以上

新城鷄瘟是一種急性病，普通在

後二至三日即發病，經過三至五日即死亡。鷄體溫上升至攝氏四十二度以上，即死亡。鷄至攝氏四十二度左右，力氣衰退，食慾不振，乃至廢絕，因高熱而嗜多量飲水，鷄冠肉脣呈暗紅色乃至暗黑色，眼瞼顏面浮腫，鼻腔口腔含多量粘稠粘液，呼吸困難（可聽到喘鳴音），常常搖頭發出奇聲，排草綠色稀糞，有時也會呈神經症狀，死亡率百分之九十至百分之一百。

#### 預防可以避免受害

(1) 注意飼養管理 因本症無法治療，所以一旦發現病鷄，應即撲殺燙死或深埋以防蔓延。鷄舍、運動場應行澈底的消毒。因為本病毒對消毒藥水抵抗力較弱，如使用一%來蘇水或二%苛性鈉，行二至三次消毒，即

可消滅病毒。

感染病毒後二至三日即發病，經過三至五日即死亡。

### 土壤殺菌劑！

西瓜黃瓜及其他瓜類之  
蔓割病！蔓病！

### 北興收祿生乳劑 100c.c.

(SoilcinE.C.)

收祿生乳劑就是具備這些條件之最可靠之上壤消毒劑。多年栽培的柑桔紋羽病，褐腐病，蔬菜蕃茄之立枯病，蔬菜落花生之立枯病，白網病等均係土壤菌類引起的病害，收祿生乳劑對於這病可以收到完全的治病效果，預防時使用二千倍稀釋液灌注（治療時用六百倍液塗抹）。

### 土壤消毒的原理：

- (1) 土壤消毒劑必須能在土壤中發揮強烈殺菌效果，而無被土壤吸收，分解之慮者。
- (2) 須能大量浸透入土壤中。
- (3) 須具有長時間的持續效果。
- (4) 對於作物無害等具備好此條件者，始可謂之完善之土壤消毒劑。

中華植物保護技術學會鄭重推薦

### 稻熱病特效藥！

北興富米農 片劑

殺蟲劑 三K 安特靈 乳劑 現貨供應

總代理 大勝貿易有限公司  
臺北市太原路20號 電話：45877, 41337號

——的用實又錢省

## 自育肥丸注射筒

臺中縣沙鹿鎮王振芝

法：豫防注射用的新城鷄瘟疫苗，在已改用筋肉注射用死毒疫苗（數年前的是靜脈內注射用），所以，要注

意注射於筋肉內，如注射於皮下則效果不好，如注射到血管內或把針頭插到肝臟，則會即刻死亡。


豫防注射用的新城鷄瘟疫苗，在鷄隻健康，未發生瘟疫時施行。如果等到發現病鷄後才施行注射，則不能得到理想的防治效果。

豫防注射用的新城鷄瘟疫苗，現在已改用筋肉注射用死毒疫苗（數年前的是靜脈內注射用），所以，要注重注射於筋肉內，如注射於皮下則效果不好，如注射到血管內或把針頭插到肝臟，則會即刻死亡。

豫防注射用的新城鷄瘟疫苗，在進行活毒疫苗的試驗中，這種疫苗是用點鼻或噴霧方式使鷄獲得免疫效果的。此項試驗，如能順利進行，則在不久的將來，即可應用非法射預防方式，使鷄獲得更長的免疫期間，來保障養鷄的安全。

對於家禽疾病的防治，在農復會的資助下，農林廳已計劃在鄉鎮公所建設課，或農會推廣股主辦下，由農事小組長和四健會會員合力推行。各單位農友如果需要幫助，都可以向上述各單位洽商或申請替你的家禽作預防打針，以確保安全，增加生產。

用時先將藥丸由針筒上端（平口的一端）放入，再插竹筷，在鷄頸上用鉗子刺一洞，由洞插入，把竹筷一頂，藥丸即進入鷄頸內了。



材料：(1)鷄翅膀一支。(2)管粗細，須與藥丸大小配合。(3)腳踏車條一支（長十二公分）。

現◎

貨◎供◎應◎

徵求縣市經銷處

種子行均有售  
●全省各地農藥行，

信富農產種苗行



(使用說明書函索即寄)

●勝過任何種

保證效力

植物促進劑

提早收穫改善品質

彰化縣溪湖鎮員鹿路66號二  
Tel. 122  
員林鎮中正路88號  
郵局劃撥中字第20760號  
高雄市中正四路180號  
郵政劃撥高字第40714號

則可得到三至六個月的免疫。如在第一次注射後經三至四個月時再行注射一次，則可延長免疫期間至九個月以上。

## 新疫苗正在試驗中

為預防病菌侵入，在本病流行時期，不要隨便購用來源不明的少量剩餘飼料。青飼料宜用五%漂白粉水洗滌消毒後餵給。管理人員出入鷄舍時應行消毒，禁止管理人員以外的人出入或參觀鷄舍，並盡量防止野鳥、野獸侵入。停止購入新鷄，如需新購，則應隔離觀察二至三週，認為健康後方可放入混飼。

(2)預防注射 預防注射應該在鷄隻健康，未發生瘟疫時施行。如果等到發現病鷄後才施行注射，則不能得到理想的防治效果。

豫防注射用的新城鷄瘟疫苗，在鷄隻健康，未發生瘟疫時施行。如果等到發現病鷄後才施行注射，則不能得到理想的防治效果。