



養雞嚴重問題之一

新城鷄瘟

養過鷄的農友們都說新城鷄瘟可怕，沒有養過鷄的朋友們也一定會提醒你注意新城鷄瘟，甚至勸你打消養鷄的念頭。新城鷄瘟是一種急性的鷄傳染病，傳染力 very strong，死亡率也很高，可是只要注意日常管理與預防注射，本病是可以預防的。

新城鷄瘟是由一種過濾性病毒所引起的急性鷄傳染病，在本省，已有相當久的歷史，過去因本症普遍蔓延而招來的損失頗為慘重，以致許多人不敢嘗試大規模的養鷄。

大鷄小鷄都會感染

新城鷄瘟的病毒活存在病鷄的各種臟器，以及唾液、鼻汁、淚汁或糞便內，經由工人、用具、飼料、鷄販、野鳥、鼠類等傳播，使未經預防注射的鷄感染致病。

新城鷄瘟的發生雖以秋、冬兩季較多，但是整年中都會發生，且不論

死亡率在九成以上

新城鷄瘟是一種急性病，普通在

後二至三日即發病，經過三至五日即死亡。鷄體溫上升至攝氏四十二度以上，四肢震顫，食慾不振乃至廢絕，因高熱而嗜多量飲水，鷄冠肉脣呈暗紅色乃至暗黑色，眼瞼顏面浮腫，鼻腔口腔含多量粘稠粘液，呼吸困難（可聽到喘鳴音），常常搖頭發出奇聲，排草綠色稀糞，有時也會呈神經症狀，死亡率百分之九十至百分之一百。

預防可以避免受害

(1) 注意飼養管理 因本症無法治療，所以一旦發現病鷄，應即撲殺燙死或深埋以防蔓延。鷄舍、運動場應行澈底的消毒。因為本病毒對消毒藥水抵抗力較弱，如使用一%來蘇水或二%苛性鈉，行二至三次消毒，即

可消滅病毒。

感染病毒後二至三日即發病，經過三至五日即死亡。鷄體溫上升至攝氏四十二度以上，四肢震顫，食慾不振乃至廢絕，因高熱而嗜多量飲水，鷄冠肉脣呈暗紅色乃至暗黑色，眼瞼顏面浮腫，鼻腔口腔含多量粘稠粘液，呼吸困難（可聽到喘鳴音），常常搖頭發出奇聲，排草綠色稀糞，有時也會呈神經症狀，死亡率百分之九十至百分之一百。

土壤殺菌劑！

西瓜黃瓜及其他瓜類之蔓割病！蔓病！

土壤消毒的原理：

- (1) 土壤消毒劑必須能在土壤中發揮強烈殺菌效果，而無被土壤吸收，分解之慮者。
- (2) 須能大量浸透入土壤中。
- (3) 須具有長時間的持續效果。
- (4) 對於作物無害等具備好此條件者，始可謂之完善之土壤消毒劑。

收祿生乳劑 100c.c.



(SoilcinE.C.)

收祿生乳劑就是具備這些條件之最可靠之上土壤消毒劑。多年栽培的柑桔紋羽病，褐腐病，蔬菜蕃茄之立枯病，蔬菜，落花生之立枯病，白網病等均係土壤菌類引起的病害，收祿生乳劑對於這病可以收到完全的治病效果，預防時使用二千倍稀釋液灌注（治療時用六百倍液塗抹）。

中華植物保護技術學會鄭重推薦

稻熱病特效藥！！

富米農 片 錠

總代理 大勝貿易有限公司
臺北市太原路20號 電話：45877, 41337號

殺蟲劑 三K 安特靈 乳劑 現貨供應